ПЕРЕЧЕНЬ

ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМЫХ И ВАЖНЕЙШИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ, А ТАКЖЕ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2023г.

№	МНН	Форма выпуска	Категория (ГГ/ФК)	Примечания
1	2	3	4	5
1.	Анестетики			
1.1.	Средства для наркоза			
	Натрия оксибат	Раствор для инъекций (ампулы) 20% 5 мл №10	ГГ	Гиперчувствительность, гипокалиемия, миастения, поздний гестоз с артериальной гипертензией.
	Тиопентал натрий	Раствор для инфузий (флаконы)30мл	ГГ	Противопоказания: беременность,бронхиальная астма, анемия,шок и коллапс,миастения, микседема, лихорадка. Воспаление носоглотки, порфирия
1.2.	Местные анестетики			
	Прокаин	Раствор для инъекций 0,5% (ампулы) 5мл, 10мл№10, 2%(ампулы) 2мл,5мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к ПАБК и др. местным анестетикам-эфирам). Для анестезии методом ползучего инфильтрата: выраженные фиброзные изменения в тканях; для субарахноидальной анестезии - AV блокада, кровотечения, артериальная гипотензия, шок, инфицирование места проведения люмбальной пункции, септицемия.С С осторожностью Экстренные операции, сопровождающиеся острой кровопотерей, состояния, сопровождающиеся снижением печеночного кровотока (например, при ХСН, заболеваниях печени), прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности (обычно вследствие развития блокад сердца и шока), воспалительные заболевания или инфицирование места инъекции, дефицит псевдохолинэстеразы, почечная недостаточность, детский возраст (до 18 лет), у пожилых пациентов (старше 65 лет), тяжелобольных, ослабленных больных, беременность, период родов. Для субарахноидальной анестезии: боль в спине, инфекции головного мозга, доброкачественные и злокачественные новообразования головного мозга, коагулопатии, мигрень, субарахноидальное кровоизлияние, артериальная гипотензия, парестезии кожи, психозы, истерия, неконтактные больные, невозможность проведения пункции из-за деформации позвоночника.

	Бупивакаин	Раствор для инъекций 0,25% (ампулы) 10мл №10, 0,5% (ампулы) 10мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность. Не используется при проведении в/в регионарной анестезии (блокада по Биру) (случайное проникновение бупивакаина в кровеносное русло может вызвать развитие острых системных токсических реакций), не применяют для проведения парацервикальной блокады для анестезии при родах (может вызывать гибель плода), детский возраст до 5 лет. Общие противопоказания к проведению эпидуральной анестезии: острые заболевания ЦНС, выраженная артериальная гипотензия (кардиогенный или гиповолемический шок), гнойничковое поражение кожи в месте предполагаемой пункции. Общие противопоказания к проведению интратекальной анестезии: острые заболевания ЦНС, такие как менингит, полиомиелит, внутричерепное кровоизлияние, а также новообразования ЦНС; сужение спинального канала и заболевания позвоночника в фазе обострения (спондилит, опухоль) или недавняя травма (перелом) позвоночника; сепсис; пернициозная анемия с подострой комбинированной дегенерацией спинного мозга; гнойничковое поражение кожи в месте предполагаемой пункции или граничащее с местом пункции; выраженная артериальная гипотензия (кардиогенный или гиповолемический шок); нарушение свертываемости крови или сопутствующая терапия антикоагулянтами. С осторожностью: Тяжелая сердечно-сосудистая недостаточность (возможно прогрессирование), блокады сердца, почечная недостаточность, общее тяжелое состояние , снижение печеночного кровотока (например, при ХСН, заболеваниях печени), одновременное назначение антиаритмических ЛС (включая бета-адреноблокаторы) и др. местных анестетиков или ЛС, структурно сходных с местными анестетиками амидного типа (возможность развития аддитивного токсического эффекта), необходимость проведения парацервикальной анестезии, беременность III триместр, воспалительные заболевания или инфицирование места инъекции (для инфильтрационной анестезии), пожилой возраст (старше 65 лет), детский возраст от 5 до 12 лет; при эпидуральном назначении (каудальная и люмбальная анестезия) - предшествующие неврологические заболевания, артериальная гипотензия, затрудненность проведения пункции из-за деформации позвоночника; при субарахноидальном назначении - AV блокада, субарахноидальное кровоизлияние, артериальная гипотензия, септицемия, рассеянный склероз, гемиплегия, параплегия, нервно-мышечные расстройства.
	Лидокаина гидрохлорид	Раствор для инъекций(ампулы) 2% 2мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. амидным местноанестезирующим ЛС), тяжелые кровотечения, шок, инфицирование места предполагаемой инъекции, артериальная гипотензия.Для субарахноидальной анестезии - полная блокада сердца, кровотечения, артериальная гипотензия, шок, инфицирование места проведения люмбальной пункции, септицемия. С осторожностью

		Аэроз.750 доз для ФГС		Состояния, сопровождающиеся снижением печеночного кровотока (например, при ХСН, заболеваниях печени), прогрессирование сердечно-сосудистой недостаточности (обычно вследствие развития блокад сердца и шока), тяжелобольные, ослабленные больные, пожилой возраст (старше 65 лет), беременность, период лактации (проникает в молоко матери);
2.	Миорелаксанты и антихолинэстеразные средства			
	Ипидакрин	Табл. 0,02 № 50, Раствор для инъекций (ампулы) 0,015/мл 1мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, эпилепсия, экстрапирамидные нарушения с гиперкинезами, стенокардия, брадикардия, бронхиальная астма, склонность к вестибулярным расстройствам, беременность, период лактации. С осторожностью Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки (стадия обострения), тиреотоксикоз, заболевания ССС.

	Суксаметония йодид	Раствор для инъекций 2% (ампулы) 5 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, злокачественная гипертермия (в т.ч. в анамнезе), миастения, врожденная и дистрофическая миотония, мышечная дистрофия Дюшенна, закрытоугольная глаукома, острая печеночная недостаточность, отек легких, проникающие травмы глаза, бронхиальная астма, гиперкалиемия, грудной возраст (до 1 года), беременность.С осторожностью Экстренная хирургия у больных с "полным желудком", снижение активности сывороточной холинэстеразы (терминальная стадия печеночной недостаточности, анемия, кахексия, длительное голодание, хронические инфекции, распространенные ожоги, травмы, послеродовой период, столбняк, туберкулез, злокачественные новообразования, ХПН, микседема, коллагеновые болезни, состояния после переливания плазмы, плазмаферез, операции в условиях искусственного кровообращения, острая или хроническая интоксикация инсектицидами - ингибиторами холинэстеразы (при попадании внутрь) или ингибиторами холинэстеразы (неостигмина метилсульфат, физостигмин, дистигмина бромид, экотиопата йодид), одновременный прием ЛС, конкурирующих с суксаметония йодидом за холинэстеразу (например, прокаин в/в).
	Толперизон	Раствор для инъекций 10%(ампулы)1мл №5,таблетки п/о 0,15 № 30, 0,05 № 30	ФК	Гиперчувствительность (в т.ч. к лидокаину), миастения, беременность, период лактации, детский возраст (до 1 года).
	Неостигмина метилсульфат	Раствор для инъекций 0,05%(ампулы) 1мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, эпилепсия, гиперкинезы, ваготомия, ИБС, брадикардия, аритмии, стенокардия, бронхиальная астма, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, перитонит, механическая обструкция ЖКТ и мочевыводящих путей, гипертрофия предстательной железы, период острого инфекционного заболевания, интоксикации у резко ослабленных детей, беременность, период лактации
3.	Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			
3.1.	Опиоидные анальгетики и анальгетики смешанного действия			
	Морфин	Раствор для инъекций 2% (ампулы) 1 мл	ГГ	Гиперчувствительность, угнетение дыхательного центра (в т.ч. на фоне алкогольного или наркотического отравления) и ЦНС, паралитическая кишечная непроходимость.При эпидуральной и спинальной анестезии - нарушение свертывания крови (в т.ч. на фоне антикоагулянтной терапии), инфекции (риск проникновения инфекции в ЦНС).

				С осторожностью Боль в животе неясной этиологии, приступ бронхиальной астмы, ХОБЛ, аритмии, судороги, лекарственная зависимость (в т.ч. в анамнезе), алкоголизм, суицидальная наклонность, эмоциональная лабильность, желчнокаменная болезнь, хирургические вмешательства на ЖКТ, мочевыводящей системе, травмы головного мозга, внутричерепная гипертензия, печеночная или почечная недостаточность, гипотиреоз, тяжелые воспалительные заболевания кишечника, гиперплазия предстательной железы, стриктуры мочеиспускательного канала, паралитическая кишечная непроходимость, эпилептический синдром, состояния после хирургического вмешательства на желчевыводящих путях, легочно-сердечная недостаточность на фоне хронических заболеваний легких, беременность, период лактации, одновременное лечение ингибиторами МАО.Общее тяжелое состояние больных, пожилой возраст, детский возраст.
	Тримеперидин	Раствор для инъекций 2% (ампулы) 1мл	ГГ	Гиперчувствительность, угнетение дыхательного центра; при эпидуральной и спинальной анестезии - нарушение свертывания крови (в т.ч. на фоне антикоагулянтной терапии), инфекции (риск проникновения инфекции в ЦНС); диарея на фоне псевдомембранозного колита, обусловленного цефалоспоринами, линкозамидами, пенициллинами, токсическая диспепсия (замедление выведения токсинов и связанное с этим обострение и пролонгация диареи); одновременное лечение ингибиторами МАО (в т.ч. в течение 21 дня после их применения). С осторожностью Боль в животе неясной этиологии, хирургические вмешательства на ЖКТ, мочевыводящей системе, бронхиальная астма, ХОБЛ, судороги, аритмии, артериальная гипотензия, ХСН, дыхательная недостаточность, печеночная и/или почечная недостаточность, микседема, гипотиреоз, надпочечниковая недостаточность, угнетение ЦНС, внутричерепная гипертензия, ЧМТ, гиперплазия предстательной железы, суицидальная наклонность, эмоциональная лабильность, наркотическая зависимость (в т.ч. в анамнезе), тяжелые воспалительные заболевания кишечника, стриктуры мочеиспускательного канала, алкоголизм, тяжелобольные, ослабленные больные, кахексия, беременность, период лактации, пожилой возраст, детский возраст.

	Трамадол	Раствор для инъекций 100мг/2 мл (ампулы) № 5	ГГ	Гиперчувствительность, отравление алкоголем, снотворными ЛС, наркотическими анальгетиками и др. психоактивными ЛС, прием ингибиторов МАО, риск суицида, склонность к злоупотреблению психоактивными веществами, беременность, период лактации (в случае длительного применения), детский возраст (до 1 года - для парентерального введения; до 14 лет - для приема внутрь). С осторожностью Опиодная наркомания, нарушение сознания различного генеза, внутричерепная гипертензия, ЧМТ, эпилептический синдром (церебрального генеза), состояния, сопровождающиеся угнетением дыхания или выраженным угнетением ЦНС; одновременное назначение с селективными ингибиторами обратного захвата серотонина (некоторыми антидепрессантами и ЛС, снижающими аппетит), трициклическими антидепрессантами, прочими трициклическими соединениями (например, прометазином), противомигренозными ЛС (триптанами), наркотическими анальгетиками, ингибиторами МАО, нейролептиками и др. ЛС, снижающими порог судорожной готовности.
	Фентанил	раствор для инъекций 0,005% (ампулы) 1 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелое угнетение дыхательного центра.ТТС - острые или послеоперационные боли (невозможность адекватного подбора дозы при коротком периоде лечения, что может привести к тяжелой или угрожающей жизни гиповентиляции), раздраженная, облученная или поврежденная кожа (в месте аппликации), диарея на фоне псевдомембранозного колита, обусловленного цефалоспоринами, линкозамидами, пенициллинами, токсическая диспепсия; острое угнетение дыхания, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью Брадиаритмия, артериальная гипотензия, почечная и/или печеночная недостаточность, острые хирургические заболевания органов брюшной полости до установления диагноза; кесарево сечение и др. акушерские операции (до извлечения плода), дыхательная недостаточность (пневмония, ателектаз и инфаркт легкого, бронхиальная астма, склонность к бронхоспазму), черепно-мозговая травма, внутричерепная гипертензия, опухоль мозга, гипотиреоз, печеночная и/или почечная колика, желчнокаменная болезнь, общее тяжелое состояние, ослабленные пациенты, доброкачественная гипертрофия предстательной железы, стриктуры мочеиспускательного канала, лекарственная зависимость, алкоголизм, суицидальная наклонность, гипертермия, одновременный прием инсулина, ГКС, гипотензивных ЛС, ингибиторов МАО.Раствор для инъекций (дополнительно) - беременность, период лактации, пожилой возраст, ранний детский возраст.
3.2.	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства			
	Диклофенак	Раствор для инъекций 2,5% (ампулы) 5 мл № 10,3мл № 5, 25мг/3мл № 5 табл.п/о 0,1 № 20,	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК или др. НПВП (в т.ч. в анамнезе), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ и 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение, воспалительные заболевания кишечника, тяжелая печеночная и сердечная недостаточность; период после проведения аортокоронарного шунтирования; тяжёлая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, активное заболевание печени, подтверждённая гиперкалиемия, беременность (III триместр), период лактации, детский возраст (до 14 лет - для таблеток, покрытых

				кишечнорастворимой оболочкой 50 мг, и суппозиториев ректальных 50 мг, до 18 лет - для таблеток пролонгированного действия и суппозиториев 100 мг).При ректальном применении (дополнительно): проктит. Для ЛФ, содержащих в составе лактозу (дополнительно): наследственная непереносимость лактозы, нарушение всасывания глюкозы-галактозы, недостаточность лактазы. С осторожностью Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, болезнь Крона, заболевания печени в анамнезе, печеночная порфирия, ХПН, ХСН, артериальная гипертензия, значительное снижение ОЦК (в т.ч. после обширного хирургического вмешательства), пожилые пациенты (в т.ч. получающие диуретики, ослабленные пациенты и с низкой массой тела), бронхиальная астма, одновременный прием ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч.АСК, клопидогрела), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина), ИБС, цереброваскулярные заболевания, дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, курение, ХПН (КК 30-60 мл/мин), наличие инфекции Helicobacter pylori, длительное использование НПВП, алкоголизм, тяжёлые соматические заболевания.
	Декскетопрофен трометамол (дексалгин)	Ампулы 25мг/мл 2 мл№5	ГГ	Противопоказания: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе, другие активные кровотечения (в т.ч. подозрение на внутричерепное кровотечение), антикоагулянтная терапия; желудочно-кишечные заболевания (болезнь Крона, неспецифический язвенный колит); тяжелые нарушения функции печени (10-15 баллов по шкале Чайлд-Пью); тяжелые нарушения функции почек (КК < 50 мл/мин); бронхиальная астма (в т.ч. в анамнезе); тяжелая сердечная недостаточность; лечение болевого синдрома при аортокоронарном шунтировании; геморрагический диатез или другие нарушения коагуляции; детский возраст; повышенная чувствительность к декскетопрофену или другим НПВП или к любому из вспомогательных веществ, входящих в состав препарата.

	Кетопрофен	Раствор для инъекций 100мг/2 мл капсулы 0,2 № 20	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. НПВП), бронхиальная астма, ринит или крапивница в анамнезе, вызванные приемом АСК или др. НПВП, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (обострение), язвенный колит (обострение), болезнь Крона, дивертикулит, пептическая язва, гемофилия и др. нарушения свертывания крови, активное желудочно-кишечное кровотечение; тяжёлая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени, состояние после проведения аортокоронарного шунтирования, подтверждённая гиперкалиемия, воспалительные заболевания кишечника, детский возраст (до 6 лет), беременность (III триместр). С осторожностью Анемия, бронхиальная астма, алкоголизм, табакокурение, алкогольный цирроз печени, гипербилирубинемия, печеночная недостаточность, дегидратация, сепсис, ХСН, отеки, артериальная гипертензия, заболевания крови (в т.ч. лейкопения), стоматит, ИБС, цереброваскулярные заболевания, дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные поражения ЖКТ в анамнезе, наличие инфекции Helicobacter pylori, длительное использование НПВП, тяжёлые соматические заболевания, одновременный приём пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч. клопидогреля), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина), пожилой возраст, беременность (I, II триместр), период лактации.
	Кеторолак	Раствор для инъекций 30мг/мл № 10 таблетки п/о 0,01 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК или др. НПВП (в т.ч. в анамнезе), крапивница, ринит, вызванные приемом НПВП (в анамнезе); непереносимость ЛС пиразолонового ряда, гиповолемия (независимо от вызвавшей ее причины), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ в стадии обострения, гипокоагуляция (в т.ч. гемофилия), кровотечения или высокий риск их развития, тяжелая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), тяжёлая печеночная недостаточность или активное заболевание печени, состояние после проведения АКШ, подтверждённая гиперкалиемия, беременность (III триместр), воспалительные заболевания кишечника, период родов, период лактации, детский возраст до 16 лет (безопасность и эффективность применения не установлены). С осторожностью Бронхиальная астма, наличие факторов, повышающих ЖКТ-токсичность: алкоголизм, табакокурение и холецистит; послеоперационный период, ХСН, отечный синдром, артериальная гипертензия, нарушение функции почек (креатинин плазмы ниже 50 мг/л), холестаз, активный гепатит, сепсис, СКВ, одновременный прием с др. НПВП, ИБС, цереброваскулярные заболевания, дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные поражения ЖКТ в анамнезе, наличие инфекции H.pylori, длительное применение НПВП, тяжелые соматические заболевания, одновременный прием пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч. клопидогрела), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина), пожилой возраст (старше 65 лет), беременность.

	Ацетилсалициловая кислота	Табл. 0,5 № 10 Таблетки п/о кш/раств 0,075 №30	ГГ	Гиперчувствительность к АСК (в т.ч. к др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (в фазе обострения), желудочно-кишечное кровотечение, геморрагический диатез, бронхиальная астма, индуцированная приемом салицилатов и НПВП, сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК, одновременный прием метотрексата в дозе 15 мг/нед и более, беременность (I и III триместр), период лактации, детский и подростковый возраст (до 18 лет). С осторожностью Подагра, гиперурикемия, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки или желудочно-кишечные кровотечения (в анамнезе), почечная/печеночная недостаточность, бронхиальная астма, ХОБЛ, сенная лихорадка, полипоз носа, лекарственная аллергия, одновременный прием метотрексата в дозе менее 15 мг/нед, сопутствующая терапия антикоагулянтами, беременность (II триместр).
	Ацетилсалициловая кислота	Таблетки 0,3 № 20, 0,1 № 20	ГГ	То же
	Ацетилсалициловая кислота + магния гидроксид	Табл. 0,15 № 30, 0,15 № 100	ФК	То же
	Лорноксикам	Порошок для инъекций 0,008 (ампулы) №5	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к АСК и др. НПВП), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит) в стадии обострения, бронхиальная астма, тяжелая ХСН, гиповолемия, гипокоагуляция (в т.ч. гемофилия, геморрагический диатез, тромбоцитопения), дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы; кровоизлияние в головной мозг (в т.ч. подозрение), тяжёлая почечная недостаточность (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени, состояние после проведения аортокоронарного шунтирования, подтверждённая гиперкалиемия, воспалительные заболевания кишечника, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (отсутствие клинического опыта). С осторожностью Эрозивно-язвенные поражения и кровотечения из ЖКТ (в анамнезе), умеренно выраженная почечная недостаточность, состояния после хирургических вмешательств, возраст старше 65 лет, масса тела менее 50 кг, ИБС, ХСН, цереброваскулярные заболевания, дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, курение, ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные поражения ЖКТ в анамнезе, наличие инфекции H.pylori, длительное использование НПВП, алкоголизм, тяжёлые соматические заболевания, одновременный приём пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч. клопидогреля), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина).
	Мелоксикам	Табл. 0,015 № 20,	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к НПВП др. групп), сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза

		амп.15мг 1,5мл № 3		носа и околоносовых пазух и непереносимости АСК и ЛС пиразолонового ряда; язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения), тяжелая печеночная недостаточность, ХПН у больных, не подвергающихся диализу (КК менее 30 мл/мин), активное желудочно-кишечное кровотечение; прогрессирующие заболевания почек, тяжелая печеночная недостаточность или активное заболевание печени, состояние после проведения аортокоронарного шунтирования, подтверждённая гиперкалиемия, воспалительные заболевания кишечника, детский возраст (до 12 лет), беременность, период лактации. С осторожностью Пожилой возраст, ИБС, ХСН, цереброваскулярные заболевания, дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, курение, ХПН (КК 30-60 мл/мин), язвенные поражения ЖКТ в анамнезе, наличие инфекции H. pylori, длительное использование НПВП, алкоголизм, тяжёлые соматические заболевания, одновременный приём пероральных ГКС (в т.ч. преднизолона), антикоагулянтов (в т.ч. варфарина), антиагрегантов (в т.ч. клопидогрела), селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрама, флуоксетина, пароксетина, сертралина).Для ректального введения (дополнительно): воспалительные заболевания прямой кишки и анального отдела, ректальное или анальное кровотечение (в т.ч. в анамнезе).
	Парацетамол	Табл. 0,5 № 10, раствор для инъекций 10 мг/мл (флаконы)100 мл	ГГ	Гиперчувствительность, период новорожденности (до 1 мес). С осторожностьюПочечная и печеночная недостаточность, доброкачественные гипербилирубинемии (в т.ч. синдром Жильбера), вирусный гепатит, алкогольное поражение печени, алкоголизм, сахарный диабет (для сиропа), беременность, период лактации, пожилой возраст, ранний грудной возраст (до 3 мес).
	Нимесулид	Таблетки 0,1 № 20, 0,1 № 30	ФК	Гиперчувствительность, полное или неполное сочетание бронхиальной астмы, рецидивирующего полипоза носа или околоносовых пазух и непереносимости АСК и др. НПВП (в т.ч. в анамнезе), эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки, активное желудочно-кишечное кровотечение, цереброваскулярное или иное кровотечение, воспалительные заболевания кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в фазе обострения, гемофилия и др. нарушения свертываемости крови, декомпенсированная ХСН, печеночная недостаточность или любое активное заболевание печени, гепатотоксические реакции при использовании нимесулида в анамнезе, алкоголизм, наркомания, выраженная ХПН (КК менее 30 мл/мин), прогрессирующие заболевания почек, подтвержденная гиперкалиемия, период после проведения аортокоронарного шунтирования, одновременный прием др. гепатотоксических ЛС, беременность, период лактации, детский возраст до 12 лет. С осторожностью ИБС, цереброваскулярные заболевания, ХСН, дислипидемия/гиперлипидемия, сахарный диабет, заболевания периферических артерий, курение, почечная недостаточность (КК 30-60 мл/мин), анамнестические данные о развитии язвенного поражения ЖКТ, наличие инфекции Helicobacter pylori, пожилой возраст, длительное использование НПВП, алкоголизм, тяжелые соматические заболевания, одновременный прием антикоагулянтов (в т.ч. варфарин), антиагрегантов (в т.ч. АСК, клопидогрел), пероральных ГКС, селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (в т.ч. циталопрам, флуоксетин, пароксетин, сертралин).
	Метамизол натрия	Раствор для инъекций 50% (ампулы) 2 мл № 10,	ФК	Гиперчувствительность, угнетение кроветворения (агранулоцитоз, цитостатическая или инфекционная нейтропения), печеночная и/или почечная недостаточность, наследственная гемолитическая анемия, связанная с дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, бронхиальная астма, индуцированная приемом АСК, салицилатов или др. НПВП, анемия, лейкопения, беременность (особенно в I триместре и в последние 6 нед), период лактации

		таблетки 0,5 № 10,		период лактации. С осторожностью Младенческий возраст до 3 мес, заболевания почек (пиелонефрит, гломерулонефрит - в т.ч. в анамнезе), длительное злоупотребление этанолом.В/в введение больным с систолическим АД ниже 100 мм рт.ст. или при нестабильности кровообращения (например, на фоне инфаркта миокарда, множественной травмы, начинающемся шоке).
	Метамизол натрий+фенпивериний бромид+питофенон	Раствор для инъекций 5 мл № 5, таблетки № 20	ФК ФК	То же
	Флупиртин	Капсулы 100 мг № 10	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная недостаточность с явлениями энцефалопатии, холестаз, выраженная миастения, алкоголизм, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностьюПочечная/печеночная недостаточность, гипоальбуминемия, возраст старше 65 лет.
3.3.	Средства для лечения подагры			
	Аллопуринол	Таблетки 0,1 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, ХПН (стадия азотемии), первичный (идиопатический) гемохроматоз, бессимптомная гиперурикемия, острый приступ подагры, беременность, период лактации. С осторожностью Почечная недостаточность, ХСН, сахарный диабет, артериальная гипертензия.Детский возраст (до 14 лет назначают только во время цитостатической терапии лейкозов и др. злокачественных заболеваний, а также симптоматического лечения ферментных нарушений).
3.4.	Прочие противовоспалительные средства			
	Сульфасалазин	Таблетки п/о 0,5 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная и/или почечная недостаточность, апластическая анемия, порфирия, гранулоцитопения, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, обструкция кишечника или мочевыводящих путей; период лактации, детский возраст (до 5 лет). С осторожностью Бронхиальная астма, атопический дерматит, аллергические реакции в анамнезе на производные сульфонамида, системные формы ювенильного ревматоидного артрита (риск развития сывороточной болезни); беременность.
	Месалазин	Таблетки п/о 0,5 № 50	ГГ	Гиперчувствительность (при применении клизм, в т.ч. к метил- и пропилпарабену), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, геморрагический диатез, тяжелая почечная/печеночная недостаточность, период лактации, последние 2-4 нед беременности, детский возраст (до 2 лет). С осторожностью Беременность (I триместр), печеночная и/или почечная недостаточность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
	Фенспирид	Таблетки 0,08 №30		Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (до 14 лет - для таблеток).

	Хондроитин сульфат	Раствор для инъекций (ампулы)0,1 № 10	ФК	Гиперчувствительность, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Кровотечения и склонность к кровоточивости, тромбофлебиты. Беременность, период лактации.
4.	Средства для лечения аллергических реакций			
	Дифенгидрамин	Раствор для инъекций 1% (ампулы) 1 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, стенозирующая язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, стеноз шейки мочевого пузыря, эпилепсия, детский возраст (до 7 мес). С осторожностью Бронхиальная астма, беременность, период лактации.
	Лоратадин	Таблетки 0,01 № 10, 0,01 № 7	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (до 1 года), детский возраст (до 12 лет) для таблетированных форм.Для сиропа (дополнительно, в связи с наличием в составе сахарозы и сорбитола): наследственная непереносимость фруктозы, нарушение всасывания глюкозы/галактозы или недостаточность сахарозы/изомальтозы. С осторожностью Тяжелая ХПН.
	Хлоропирамин	Таблетки 0,025 № 20, раствор для инъекций 20мг/мл (ампулы)1мл № 5	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, дыхательная недостаточность, одновременный прием ингибиторов МАО, ранний грудной возраст (до 1 мес). С осторожностью Пептическая язва ЖКТ, прием ингибиторов МАО и др. ЛС, угнетающих ЦНС.
	Клемастин	Таблетки 0,001 № 20, раствор для инъекций 1мг/мл 2 мл № 5	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (до 1 года), одновременный прием ингибиторов МАО, заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма). С осторожностью Закрытоугольная глаукома, стеноз привратника желудка, гиперплазия предстательной железы, сопровождающаяся задержкой мочи, обструкция шейки мочевого пузыря, тиреотоксикоз, заболевания ССС (в т.ч. артериальная гипертензия), детский возраст (до 6 лет - для таблеток, 1 год - для сиропа и раствора для инъекций).
5.	Средства ,влияющие на центральную нервную систему			
5.1.	Противосудорожные средства			
	Фенобарбитал	Таблетки 0,1 № 10	ГГ	Гиперчувствительность, порфирия (в т.ч. в анамнезе), беременность (I и III триместры), период лактации. С осторожностью Анемия, ХОБЛ, брохоспазм (в т.ч. в анамнезе), астматический статус, одышка, сахарный диабет, лекарственная зависимость, печеночная недостаточность (в т.ч. в анамнезе), печеночная кома, гиперкинез, тиреотоксикоз, гипофункция надпочечников (в т.ч. пограничные состояния), депрессия, суицид, острый и/или хронический болевой синдром, почечная недостаточность (для ЛФ с длительным периодом выведения), ослабленные больные.
	Вальпроевая кислота	Таблетки хроно п/о табл.п/о 0,3 № 100,	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, острый и хронический гепатит, нарушения функции поджелудочной железы, порфирия, геморрагический диатез, выраженная тромбоцитопения, период лактации.

		лиоф.порошок д/приг раствора для /в/в введ.400 мг 4 фл		С осторожностью Угнетение костномозгового кроветворения (лейкопения, тромбоцитопения, анемия), органические заболевания головного мозга, заболевания печени и поджелудочной железы в анамнезе; гипопротеинемия, умственная отсталость у детей, врожденные ферментопатии, почечная недостаточность, беременность, детский возраст до 3 лет.
	Габапентин	Капсулы 0,1 № 10, капс.0,3 № 10,	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Беременность, период лактации, почечная недостаточность.
	Карбамазепин	Таблетки п/о 0,2 № 50	ГГ	Гиперчувствительность к карбамазепину или сходным в химическом отношении ЛС (например, трициклическим антидепрессантам) или к любому др. компоненту препарата; нарушения костномозгового кроветворения (анемия, лейкопения), острая "перемежающаяся" порфирия (в т.ч. в анамнезе), AV блокада, одновременный прием ингибиторов МАО. С осторожностью Декомпенсированная ХСН, гипонатриемия разведения (синдром гиперсекреции АДГ, гипопитуитаризм, гипотиреоз, недостаточность коры надпочечников), пожилой возраст, активный алкоголизм (усиливается угнетение ЦНС, усиливается метаболизм карбамазепина), угнетение костномозгового кроветворения на фоне приема ЛС (в анамнезе); печеночная недостаточность, ХПН; гиперплазия предстательной железы, повышение внутриглазного давления.
	Клоназепам	Таблетки 0,002 № 30, 0,0005 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, угнетение дыхательного центра, тяжелая ХОБЛ (прогрессирование степени дыхательной недостаточности), острая дыхательная недостаточность, миастения, кома, шок, закрытоугольная глаукома (острый приступ или предрасположенность), острая алкогольная интоксикация с ослаблением жизненно важных функций, острые отравления наркотическими анальгетиками и снотворными ЛС, тяжелая депрессия (могут отмечаться суицидальные наклонности), беременность (особенно I триместр), период лактации. С осторожностьюСпинальная или мозжечковая атаксия, гиперкинезы, гипопротеинемия (заболевания, приводящие к ее развитию), лекарственная зависимость в анамнезе, склонность к злоупотреблению психоактивными ЛС, хронический алкоголизм, почечная и/или печеночная недостаточность, ХСН, органические заболевания головного мозга, бронхоспастический синдром, психозы (парадоксальное усиление симптоматики), нарушение глотания у детей, ночное апноэ (установленное или предполагаемое), пред- и послеоперационный периоды (подавляет кашлевой рефлекс), пожилой возраст.
	Бензобарбитал	Таблетки 0,1 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, ХПН, ХСН II-III ст., порфирия, анемия, бронхиальная астма, дыхательная недостаточность, сахарный диабет, тиреотоксикоз, надпочечниковая недостаточность, гиперкинезы, депрессивные состояния (с суицидальными попытками).
	Ламотриджин	Таблетки 50 мг № 30	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Беременность (возможно увеличение частоты развития расщелины верхней губы), период лактации, ХПН
	Топирамат	Таблетки 0,025 № 28, 0,025 № 60	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст (до 2 лет). С осторожностью Почечная/печеночная недостаточность, нефроуролитиаз (в анамнезе, в т.ч. в семейном), гиперкальциурия.

	Прегабалин	Капсулы 0,075 №14, капсулы 0,15 № 14	ГГ	Противопоказания Гиперчувствительность, детский возраст (до 17 лет), период лактации; для ЛФ, содержащих лактозу - непереносимость галактозы, лактазная недостаточность Лапа, нарушение всасывания глюкозы/галактозы.С осторожностью Почечная недостаточность, сахарный диабет, беременность.
	Окскарбазепин	Таблетки п/о 300 мг № 10	ГГ	Гиперчувствительность, период лактации. С осторожностью Гиперчувствительность к карбамазепину в анамнезе (в 25-30% могут развиваться перекрестные аллергические реакции на окскарбазепин), беременность. Применение препарата у детей младше 2 лет не изучалось.
5.2.	Средства для лечения паркинсонизма			
	Амантадин	Таблетки 0,1 № 100, п/о 0,1 №30, раствор для инъекций0,2/500мл № 2	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная недостаточность, ХПН, психозы (в анамнезе), тиреотоксикоз, эпилепсия, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, артериальная гипотензия, ХСН II-III ст., состояние возбуждения, предделирий, делириозный психоз, беременность (I триместр), период лактации, одновременный прием триамтерена/гидрохлоротиазида. С осторожностью Ортостатическая артериальная гипотензия, аллергический дерматит, беременность (II-III триместры), пожилой возраст, алкоголизм, психические расстройства (в т.ч. в анамнезе)
	Тригексифенидил	Таблетки 0,002 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, механические стенозы ЖКТ, мегаколон, закрытоугольная глаукома, задержка мочи, гиперплазия предстательной железы (с наличием остаточной мочи), беременность (I триместр), отек легких, деменция. С осторожностью Декомпенсированные заболевания сердца, почек или печени, тахикардия, тахиаритмия, артериальная гипертензия, психоз, острый инфаркт миокарда, пожилой возраст
	Пирибедил	Таблетки п/о 0,05 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, артериальная гипотензия, инфаркт миокарда (острая фаза); беременность, период лактации.
	Леводопа+бенсеразид	Капс. 0,1+0,025 № 100, таблетки 0,2+0,05 №100, 0,1+0,025 №100 диспергируемые таблетки(быстродействующие)	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелые нарушения деятельности сердечно-сосудистой, эндокринной системы, печени, почек (за исключением пациентов с синдромом "беспокойных ног", получающих диализ), психические заблолевания с психотическим компонентом, закрытоугольная глаукома, одновременный прием неселективных ингибиторов МАО или комбинации ингибиторов МАО-А и МАО-В, беременность, период лактации, возраст до 25 лет, женщины детородного возраста, не использующие надежные методы контрацепции.
	Леводопа+Карбидопа	Таблетки 0,25/0,025 № 100,	ГГ	Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, меланома и подозрение на нее и кожные заболевания неизвестной этиологии, одновременный прием неселективных ингибиторов МАО, возраст до 18 лет.

		0,25/0,025 № 50		С осторожностью Инфаркт миокарда с нарушениями ритма (в анамнезе), ХСН и др. тяжелые заболевания ССС, тяжелые заболевания легких, в т.ч. бронхиальная астма, заболевания легких, эпилептические и др. судорожные припадки (в анамнезе), эрозивно-язвенные поражения ЖКТ (риск развития кровотечения из верхних отделов ЖКТ), сахарный диабет и др. декомпенсированные эндокринные заболевания, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, открытоугольная глаукома, беременность, период лактации
	Прамипексол	Таблетки 0,25 мг № 30	ФК	Гиперчувствительность, беременность, период лактации. С осторожностью Почечная недостаточность, артериальная гипотензия.
5.3.	Анксиолитики (транквилизаторы)			
	Диазепам	Таблетки 0,01 № 20, раствор для инъекций 0,5% (ампулы) 2мл	ГГ	Гиперчувствительность, кома, шок, острая алкогольная интоксикация с ослаблением жизненно важных функций, острые интоксикации ЛС, оказывающими угнетающее действие на ЦНС (в т.ч. наркотические анальгетики и снотворные ЛС), миастения, закрытоугольная глаукома (острый приступ или предрасположенность); тяжелая ХОБЛ (опасность прогрессирования степени дыхательной недостаточности), острая дыхательная недостаточность, беременность, период лактации, детский возраст до 6 мес (при приеме внутрь), до 30 дней включительно (при в/м и в/в введении). С осторожностью Эпилепсия или эпилептические припадки в анамнезе (начало лечения диазепамом или его резкая отмена могут ускорять развитие припадков или эпилептического статуса), абсанс или синдром Леннокса-Гасто (при в/в введении способствует возникновению тонического эпилептического статуса), печеночная и/или почечная недостаточность, церебральные и спинальные атаксии, гиперкинезы, лекарственная зависимость в анамнезе, склонность к злоупотреблению психоактивными ЛС, органические заболевания головного мозга, гипопротеинемия, ночное апноэ (установленное или предполагаемое), пожилой возраст.
	Тофизопам	Таблетки 0,05 № 20, 0,05 № 60	ФК	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. бензодиазепинам), кома, шок, миастения, закрытоугольная глаукома (острый приступ или предрасположенность), острые отравления алкоголем (с ослаблением жизненно важных функций), наркотическими анальгетиками и снотворными ЛС, тяжелая ХОБЛ (возможно усиление дыхательной недостаточности), острая дыхательная недостаточность, тяжелая депрессия (могут проявляться суицидальные наклонности); беременность (особенно I триместр), период лактации, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не определены). С осторожностью Печеночная и/или почечная недостаточность, церебральные и спинальные атаксии, лекарственная зависимость в анамнезе, склонность к злоупотреблению психоактивными ЛС, гиперкинезы, органические заболевания головного мозга, психоз (возможны парадоксальные реакции), гипопротеинемия, ночное апноэ (установленное или предполагаемое), пожилой возраст.
	Бромгидрохлорфенил бензодиазепин	Табл.0,001 № 50, 0,0005 № 50	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. бензодиазепинам), кома, шок, миастения, закрытоугольная глаукома (острый приступ или предрасположенность), острые отравления алкоголем (с ослаблением жизненно важных

		раствор для инъекций 0,1% (ампулы) 1мл № 10		функций), наркотическими анальгетиками и снотворными ЛС, тяжелая ХОБЛ (возможно усиление дыхательной недостаточности), острая дыхательная недостаточность, тяжелая депрессия (могут проявляться суицидальные наклонности); беременность (особенно I триместр), период лактации, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность не определены). С осторожностью Печеночная и/или почечная недостаточность, церебральные и спинальные атаксии, лекарственная зависимость в анамнезе, склонность к злоупотреблению психоактивными ЛС, гиперкинезы, органические заболевания головного мозга, психоз (возможны парадоксальные реакции), гипопротеинемия, ночное апноэ (установленное или предполагаемое), пожилой возраст.
5.4.	Антипсихотические средства			
	Хлорпромазин	Раствор для инъекций 2,5% (ампулы) 1мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелые сердечно-сосудистые заболевания (декомпенсированная ХСН, артериальная гипотензия), выраженное угнетение функции ЦНС и коматозные состояния любой этиологии; ЧМТ, прогрессирующие системные заболевания головного и спинного мозга, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в период обострения (при приеме внутрь), беременность, период лактации, детский возраст (до 6 мес). С осторожностью Алкоголизм (повышена вероятность развития гепатотоксических реакций), патологические изменения крови (нарушение кроветворения), рак молочной железы (в результате индуцированной фенотиазином секреции пролактина возрастают потенциальный риск прогрессирования болезни и резистентность к лечению эндокринными и цитостатическими ЛС), закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы с клиническими проявлениями, печеночная и/или почечная недостаточность; заболевания, сопровождающиеся повышенным риском тромбоэмболических осложнений; болезнь Паркинсона; эпилепсия; микседема; хронические заболевания, сопровождающиеся нарушением дыхания (особенно у детей); синдром Рейе в анамнезе (повышение риска развития гепатотоксичности у детей и подростков); кахексия, рвота (противорвотное действие фенотиазинов может маскировать рвоту, связанную с передозировкой др. ЛС). Пожилой возраст
	Галоперидол	Раствор для инъекций 0,5% (ампулы) 1мл № 10, таблетки 0,005 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелое угнетение функции ЦНС на фоне интоксикации ксенобиотиками, комы различного генеза, заболевания ЦНС, сопровождающиеся пирамидной или экстрапирамидной симптоматикой (в т.ч. болезнь Паркинсона), беременность, период лактации, детский возраст (до 3 лет). С осторожностью Декомпенсированные заболевания ССС (в т.ч. стенокардия, нарушения внутрисердечной проводимости, удлинение интервала Q-T или предрасположенность к этому - гипокалиемия, одновременное применение др. ЛС, которые могут вызывать удлинение интервала Q-T), эпилепсия, закрытоугольная глаукома, печеночная и/или почечная недостаточность, гипертиреоз (с явлениями тиреотоксикоза), легочно-сердечная и дыхательная недостаточность (в т.ч. при ХОБЛ и острых инфекционных заболеваниях), гиперплазия предстательной железы с задержкой мочи, алкоголизм.
	Алимемазин	Таблетки 0,005 № 50	ФК	Гиперчувствительность, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, паркинсонизм, миастения, синдром Рейе, одновременное применение ингибиторов МАО, беременность, период лактации. С осторожностью Алкоголизм (в анамнезе осложнения при применении препаратов фенотиазинового ряда), обструкция шейки мочевого пузыря, предрасположенность к задержке мочи, эпилепсия, открытоугольная глаукома, желтуха, угнетение функции костного мозга, артериальная гипотензия.

	Перициазин	Капсулы 10мг № 50	ГГ	Противопоказания Гиперчувствительность, токсический агранулоцитоз (в анамнезе), закрытоугольная глаукома, порфирия, гиперплазия предстательной железы. С осторожностью Заболевания ССС, почечная и/или печеночная недостаточность, пожилой возраст (возможны седативный и гипотензивный эффекты).
	Дроперидол	Раствор для инъекций 0,25% (ампулы) 5мл	ГГ	Гиперчувствительность, экстрапирамидные нарушения, назначение во время проведения кесарева сечения, гипокалиемия, артериальная гипотензия, синдром удлинения интервала Q-T, детский возраст (до 2 лет). С осторожностью Печеночная и/или почечная недостаточность, алкоголизм, декомпенсированная ХСН, эпилепсия, депрессия, беременность.
	Сульпирид	Раствор для инъекций (ампулы) 100мг 2 мл № 6, капс.0,05 № 30, таблетки 0,2 № 30, 0,05 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, острая интоксикация алкоголем, снотворными ЛС, наркотическими анальгетиками; маниакальный психоз, судорожные припадки, болезнь Паркинсона, феохромоцитома, пролактинзависимые опухоли (в т.ч. рак молочной железы), гиперпролактинемия, аффективные расстройства, агрессивное поведение, период лактации, детский возраст до 6 лет (капсулы), до 18 лет - для всех остальных ЛФ; при наличии в составе препарата лактозы - галактоземия, синдром мальабсорбции глюкозы/галактозы или дефицит лактазы. С осторожностью Эпилепсия, артериальная гипертензия, дисменорея, тяжелые заболевания сердца, стенокардия, почечная и/или печеночная недостаточность, злокачественный нейролептический синдром в анамнезе, глаукома, гиперплазия предстательной железы, задержка мочи, беременность, пожилой возраст.
5.5.	Антидепрессанты и средства нормотимического действия			
	Амитриптилин	Таблетки 0,025 № 50, раствор для инъекций 1% (ампулы) 2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, применение совместно с ингибиторами МАО и за 2 нед перед началом лечения, инфаркт миокарда (острый и подострый периоды), острая алкогольная интоксикация, острая интоксикация снотворными, анальгезирующими и психоактивными ЛС, закрытоугольная глаукома, тяжелые нарушения AV и внутрижелудочковой проводимости (блокада ножек пучка Гиса, AV блокада II ст.), период лактации, детский возраст (до 6 лет - пероральные формы, до 12 лет при в/м и в/в введении). С осторожностью Хронический алкоголизм, бронхиальная астма, маниакально-депрессивный психоз, угнетение костномозгового кроветворения, заболевания ССС (стенокардия, аритмия, блокады сердца, за исключением перечисленных в противопоказаниях, ХСН, перенесенный инфаркт миокарда, артериальная гипертензия), инсульт, снижение моторной функции ЖКТ (риск возникновения паралитической кишечной непроходимости), внутриглазная гипертензия, печеночная и/или почечная недостаточность, тиреотоксикоз, гиперплазия предстательной железы, задержка мочи, гипотония мочевого пузыря, шизофрения (возможна активация психоза), эпилепсия, беременность (особенно I триместр), пожилой возраст.
	Пипофезин	Таблетки 0,025 № 50, 0,025 № 250	ГГ	Гиперчувствительность, печеночная и/или почечная недостаточность, ХСН, инфаркт миокарда, ИБС, состояние после инсульта, инфекционные заболевания, сахарный диабет, беременность, период лактации, одновременный прием ингибиторов МАО. С осторожностью Детский возраст.

	Сертралин	Таблетки п/о 0,05 № 30, п/о 0,05 № 10	ГГ	Гиперчувствительность, беременность; период лактации, одновременное назначение ингибиторов МАО. С осторожностью Неврологические нарушения (в т.ч. задержка умственного развития), маниакальные состояния, эпилепсия, печеночная и/или почечная недостаточность, снижение массы тела, детский возраст.
	Агомелатин	Таблетки 0,025 № 100	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая печеночная недостаточность, деменция у пожилых, одновременный прием с потенциальными ингибиторами CYP1A2 (флувоксамин, ципрофлоксацин), этанолом, период лактации, детский возраст (до 18 лет). Для ЛФ, содержащих лактозу (дополнительно): врожденная непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью Маниакальные или гипоманиакальные эпизоды (в анамнезе), печеночная недостаточность, беременность.
5.6.	Средства для лечения нарушений сна			
	Мелатонин	Таблетки 0,003 № 24	ФК	Гиперчувствительность, аллергические заболевания, аутоиммунные заболевания, лимфогранулематоз, лейкоз, лимфома, миелома, эпилепсия, сахарный диабет, ХПН, беременность, период лактации.
5.7.	Средства для лечения опиоидных наркоманий и алкоголизма			
	Налоксон	Раствор для инъекций 0,4/мл 1мл №10	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Беременность, период лактации, заболевания сердца и легких, новорожденные от матерей с опиоидной зависимостью, детский возраст.
5.8.	Прочие средства, влияющие на центральную нервную систему			
	Баклофен	Таблетки 0,01 №50, 0,025 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, эпилепсия, судороги (в анамнезе), психозы, болезнь Паркинсона, ХПН. С осторожностью Цереброваскулярная недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, беременность, период лактации, пожилой возраст, детский возраст (до 12 лет).
	Пирацетам	Раствор для инъкций 20 % (ампулы) 5мл № 10, 20% 15мл №4, 20% 5мл № 12, капсулы 0.4 № 60,	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая ХПН (КК менее 20 мл/мин), геморрагический инсульт, психомоторное возбуждение, хорея Гентингтона, беременность, период лактации. С осторожностью Нарушение гемостаза, обширные хирургические вмешательства, тяжелое кровотечение, ХПН (КК 20-80 мл/мин).
	Бетагистин	Таблетки 0,008 № 30, 0,016 № 30, 0,024 № 20,	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст. С осторожностью Язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки (в анамнезе), феохромоцитома, бронхиальная астма.

	Пророксан	Таблетки0,015 № 50	ФК	Гиперчувствительность, атеросклероз, ИБС (тяжелые формы), нарушение мозгового кровообращения (в т.ч. в анамнезе), ХСН, детский возраст (до 6 мес). С осторожностью Пожилой возраст.
	Тизанидин	Таблетки 0,004 № 30, 0,002 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая печеночная недостаточность, одновременный прием с мощными ингибиторами изофермента CYP1A2 (флувоксамин, ципрофлоксацин), беременность, период лактации, детский возраст. С осторожностью Печеночная и/или почечная недостаточность, артериальная гипотензия, брадикардия, синдром врожденного удлинения интервала Q-T, одновременный прием пероральных контрацептивов, возраст старше 65 лет.
	Винпоцетин	Раствор для инъекций 0,5% (ампулы) 2 мл№10, 0,5%5 мл№10, таблетки 0,005 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, острая фаза геморрагического инсульта, тяжелая ИБС, тяжелые нарушения ритма сердца, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. Для ЛФ, содержащих сорбитол (дополнительно): непереносимость фруктозы, дефицит 1.6-дифосфатазы. С осторожностью Тяжелые нарушения ритма; при геморрагическом инсульте введение возможно только после стихания острых явлений (обычно через 5-7 дней).
	Ницетамид	Раствор для инъекций 25% (ампулы)1 мл № 10, 25% 2 мл № 10 флаконы 30мл	ФК	Гиперчувствительность, предрасположенность к судорогам, эпилепсия, эпилептические припадки (в анамнезе), гипертермия у детей, беременность.
	Холина альфосцерат	Капсулы 0.4 №14, раствор для инъекций (ампулы) 1мл № 3, 25% 4мл № 3	ГГ	Гиперчувствительность, геморрагический инсульт (острая стадия), беременность, период лактации, детский возраст.
	Церебролизин	Раствор для инъекций 10мл № 5	ГГ	Противопоказания: эпилептический статус, острая почечная недостаточность
	Янтарная кислота+меглюмин+инозин(рибоксин)метионин+никотинамид	фл. 400мл, контейнер полимерный 400 мл №5	ГГ	Противопоказания: гиперчувствительность

	Актовегин	раствор для инъекций 40 мг/мл (ампулы) 2, 5, 10 мл; раствор для инфузий [в растворе декстрозы] 4 мг/мл (флаконы) 250 мл; раствор для инфузий [в растворе натрия хлорида 0.9%] 4, 8 мг/мл (флаконы) 250 мл	ФК	Противопоказание: гиперчувствительность
	Метилэтилпиридинол (эмоксипин)	Ампулы 10мг/мл	ФК	Возбуждение, сонливость, повышение артериального давления, реакция в месте введения (ощущение жжения по ходу вены, боль, зуд). В редких случаях возможны головная боль, боль в области сердца, у лиц с хронической патологией органов пищеварения - тошнота, дискомфорт в эпигастральной области. При предрасположенности к аллергическим реакци¬ям в редких случаях наблюдаются появление зуда и покраснение кожи.
	Инозин+Никотинамид +Рибофлавин+Янтарная кислота	Раствор для инъекций 5мл №5	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации.
6.	Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций			
6.1.	Антибактериальные средства			
	Доксициклина гидрохлорид	Таблетки 0.1 № 10	ГГ	Гиперчувствительность, порфирия, тяжелая печеночная недостаточность, лейкопения, беременность (II-III триместры), период лактации, детский возраст (до 8 лет - возможность образования нерастворимых комплексов Ca2+ с отложением в костном скелете, эмали и дентине зубов), для в/в введения - миастения.
	Амоксициллин	Таблетки 0,5, 0,25 № 20, 0,5 № 10	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам). С осторожностью Аллергические реакции (в т.ч. в анамнезе), инфекционный мононуклеоз, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), почечная недостаточность, беременность, период лактации.
	Амоксицилли+клавулановая кислота	Табетки п/о 0,375, 0,625 № 15,	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к цефалоспоринам и др. бета-лактамным антибиотикам), инфекционный мононуклеоз (в т.ч. при появлении кореподобной сыпи), фенилкетонурия, эпизоды желтухи или нарушение функции печени в результате применения амоксициллина/клавулановой кислоты в анамнезе; КК менее 30

		порошок для инъекций 1,5 и 1,0 (флаконы) № 5		мл/мин (для таблеток 875 мг/125 мг). С осторожностью Беременность, период лактации, тяжелая печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ (в т.ч. колит в анамнезе, связанный с применением пенициллинов), ХПН.
	Ампициллин	Порошок для инъекций (флаконы)0,5	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам), инфекционный мононуклеоз, лимфолейкоз, печеночная недостаточность, заболевания ЖКТ в анамнезе (особенно колит, связанный с применением антибиотиков), период лактации. С осторожностью Бронхиальная астма, сенная лихорадка и др. аллергические заболевания, почечная недостаточность, кровотечения в анамнезе, беременность, детский возраст до 1 мес.
	Ванкомицин	Лиофилизат для приготовления р-ра для инъекций Флаконы 0,5 и 1,0	ГГ	Противопоказания Гиперчувствительность, период лактации, неврит слухового нерва.С осторожностью Нарушение слуха (в т.ч. в анамнезе), почечная недостаточность, беременность.
	Бензилпенициллин	Порошок для инъекций (флаконы)1млн	ГГ	Гиперчувствительность; эпилепсия (для эндолюмбального введения), гиперкалиемия, аритмии (для калиевой соли). С осторожностью Беременность, период лактации.
	Имипенем+циластатин	Порошок для инъекций (флаконы)0,5	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к карбапенемам и др. бета-лактамным антибиотикам), беременность (только по "жизненным" показаниям); ХПН (КК менее 5 мл/мин без проведения гемодиализа), ХПН у детей с массой тела менее 30 кг, инфекции ЦНС у детей. Для суспензии при в/м инъекции, приготовленной с использованием лидокаина в качестве растворителя - гиперчувствительность к местным анестетикам амидной структуры (шок, нарушение внутрисердечной проводимости). Дополнительно для в/м введения: детский возраст до 12 лет. С осторожностью Заболевания ЦНС, судороги в анамнезе, высокая судорожная готовность, противосудорожная терапия вальпроевой кислоты (снижение эффективности терапии), ХПН (КК 5-20 мл/мин), период лактации, пожилой возраст.
	Меропенем	Порошок для инъекций (флаконы)1,0	ГГ	Гиперчувствительность, детский возраст (до 3 мес). С осторожностью Беременность, период лактации.
	Цефотаксим	Порошок для инъекций (флаконы)1,0г	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к пенициллинам, др. цефалоспоринам, карбапенемам), детский возраст (в/м введение - до 2.5 лет). С осторожностью Период новорожденности (для в/в введения), ХПН, язвенный колит (в т.ч. анамнезе), беременность, период лактации (в незначительных концентрациях выделяется с молоком).
	Цефтриаксон	Порошок для инъекций (флаконы)1,0г	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспоринам, пенициллинам, карбапенемам), гипербилирубинемия у новорожденных, новорожденные, которым показано в/в введение растворов, содержащих Ca2+. С осторожностью Недоношенные дети, почечная и/или печеночная недостаточность, язвенный колит, энтерит или колит, связанный с применением антибактериальных ЛС, беременность, период лактации.

	Цефоперазон+сульбактам	Флаконы 1,0	ГГ	Гиперчувствительность, в т.ч. к др. цефалоспоринам, пенициллинам.С осторожностью Недоношенные дети, почечная и/или печеночная недостаточность, язвенный колит, энтерит или колит, связанный с применением антибактериальных ЛС, беременность, период лактации.
	Цефтазидим	Порошок для инъекций (флаконы)1,0г	ГГ	Гиперчувствительность, в т.ч. к др. цефалоспоринам, пенициллинам. С осторожностью Почечная недостаточность, заболевания ЖКТ (в т.ч. язвенный колит в анамнезе), одновременный прием с петлевыми диуретиками и аминогликозидами, беременность, период лактации, период новорожденности.
	Цефепим	Порошок для инъекций (флаконы)1,0г	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. цефалоспоринам, пенициллинам, др. бета-лактамным антибиотикам), детский возраст (до 2 мес). С осторожностью Беременность, период лактации, заболевания ЖКТ (в т.ч. в анамнезе), особенно колит, тяжелая ХПН.
	Азитромицин	Табл.п/о 0,25 № 6, табл. п/о 0,5 № 3 Лиофилизат для приготов. р-ра 0,5/1мл (флаконы) капсулы 0,5 № 3, 0,25 № 6	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к макролидам), тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, период лактации, детский возраст (до 12 лет с массой тела менее 45 кг - капсулы, таблетки; до 6 мес - суспензия для приема внутрь: эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Беременность, аритмия (риск развития желудочковых аритмий и удлинения интервала Q-T), печеночная и/или почечная недостаточность.
	Ампициллин+сульбактам	Порошок для инъекций	ГГ	Гиперчувствительность, инфекционный мононуклеоз, период лактации. С осторожностью Печеночная и/или почечная недостаточность, беременность
	Кларитромицин	Таблетки п/о 0,5 и 0,25 № 14,	ГГ	Гиперчувствительность, порфирия, одновременный прием астемизола, цизаприда, пимозида, терфенадина, эрготамина и др. алкалоидов спорыньи, мидазолама для приема внутрь, алпразолама, триазолама; период лактации. Для ЛФ пролонгированного действия (дополнительно): тяжелая ХПН (КК менее 30 мл/мин), детский возраст (до 18 лет). С осторожностью Почечная и/или печеночная недостаточность, миастения gravis, одновременный прием ЛС, метаболизирующихся печенью, одновременный прием колхицина, беременность
	Спирамицин	Табл.п/о1,5млн и 3млн. МЕ № 10, Порошок для инъекций	ФК	Гиперчувствительность, детский возраст (для в/в инфузий), период лактации. С осторожностью Обструкция желчных протоков или печеночная недостаточность.
	Сульфацетамид	Раствор для наружного Тюбик-капельница	ФК	Гиперчувствительность.
	Тетрациклин	Таблетки п/о100мг №20	ГГ	Гиперчувствительность, беременность (II-III триместры), период лактации, детский возраст (до 8 лет), лейкопения. С осторожностью Почечная недостаточность.

	Левофлоксацин	Таблетки0,25 и 0,5 № 10 Порошок для инъекций	ГГ	Гиперчувствительность, эпилепсия, поражение сухожилий при ранее проводившемся лечении хинолонами, беременность, период лактации, детский и подростковый возраст (до 18 лет). С осторожностью Пожилой возраст (высокая вероятность наличия сопутствующего снижения функции почек), дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы
	Офлоксацин	Табл.п/о 200 мг № 10, раствор для инфузий (флаконы)2 % 100 мл	ГГ	Гиперчувствительность, эпилепсия (в т.ч. в анамнезе), снижение судорожного порога (в т.ч. после ЧМТ, инсульта или воспалительных процессов в ЦНС), поражение сухожилий при ранее проводившемся лечении фторхинолонами; возраст до 18 лет (пока не завершен рост скелета), беременность, период лактации. С осторожностью Атеросклероз сосудов головного мозга, нарушения мозгового кровообращения (в анамнезе), ХПН, печеночная недостаточность, органические заболевания ЦНС, предрасположенность к судорожным реакциям, миастения, печеночная порфирия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, сахарный диабет, синдром врожденного удлинения интервала Q-T, заболевания сердца (СН, инфаркт миокарда, брадикардия), психозы и др. психические нарушения в анамнезе; одновременный прием ЛС, удлиняющих интервал Q-T (антиаритмические IA и III классов, трициклические и тетрациклические антидепрессанты, нейролептики, макролиды, противогрибковые, производные имидазола, некоторые антигистаминные, в т.ч. астемизол, терфенадин, эбастин), для общей анестезии из группы барбитуратов, ЛС, снижающих АД.
	Гентамицин	Раствор для инъекций 4% (ампулы) 2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), неврит слухового нерва, тяжелая ХПН с азотемией и уремией, новорожденные (до 1 мес). С осторожностью Миастения, паркинсонизм, ботулизм (аминогликозиды могут вызвать нарушение нервно-мышечной передачи, что приводит к дальнейшему ослаблению скелетной мускулатуры), дегидратация, почечная недостаточность, период новорожденности, недоношенность детей, пожилой возраст, беременность, период лактации
	Норфлоксацин	Таблетки 0.4 № 10 и	ФК	Гиперчувствительность; тендинит, разрыв сухожилия, вызванные приемом фторхинолонов (в т.ч. а анамнезе); беременность, период лактации, детский возраст, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. С осторожностью Эпилепсия, судорожный синдром, почечная/печеночная недостаточность, миастения gravis.
	Пефлоксацин	Таблетки п/о 0,4 № Раствор для инъекций 0,4/5мл (ампулы) № 10	ГГ	Гиперчувствительность, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (гемолитическая анемия), беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью Нарушение мозгового кровообращения, органические поражения ЦНС, судорожный синдром, почечная и/или печеночная недостаточность.
	Ципрофлоксацин	Таблетки п/о 0,25 и табл.п/о 0.5 № 10, Раствор для инфузий2мг/мл (флаконы) 100мл	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к производным фторхинолона или имидазола), заболевания крови (в анамнезе), угнетение костномозгового кроветворения, острая порфирия, органические заболевания ЦНС, возраст до 18 лет, беременность, период лактации. С осторожностью Выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, нарушение мозгового кровообращения, психические заболевания, эпилепсия, судороги в анамнезе, выраженная почечная и/или печеночная недостаточность, пожилой возраст.

	Фуразидин	Таблетки 0,05 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая ХПН, детский возраст, беременность, период лактации. С осторожностью ХПН, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, заболевания печени и нервной системы
6.2.	Противотуберкулезные средства			
	Стрептомицин	Порошок для инъекций (флаконы)1,0г	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. аминогликозидам в анамнезе), тяжелая ХПН с азотемией и уремией, органические поражения VIII пары черепномозговых нервов, беременность. С осторожностью Миастения, паркинсонизм, ботулизм (аминогликозиды могут вызвать нарушение нервно-мышечной передачи, что приводит к дальнейшему ослаблению скелетной мускулатуры), облитерирующий эндартериит, ХСН II-III ст., ХПН, дегидратация, нарушение мозгового кровообращения, склонность к кровоточивости, пожилой и детский возраст, период лактации.
6.3.	Противовирусные средства			
	Ацикловир	Таблетки 0,25 № 0.4 № 20, раствор для инъекций 0,004% (ампулы) № 5	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к валацикловиру), детский возраст до 3 лет (для твердых ЛФ). С осторожностью Беременность, период лактации. Для в/в введения (дополнительно) - почечная недостаточность (риск нефротоксического действия), дегидратация, неврологические нарушения или неврологические реакции на прием цитотоксичных ЛС (в т.ч. в анамнезе).
	«Йодантипирин»	Таблетки 0,1 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, гиперфункция щитовидной железы.
	Умифеновир	Таблетки п/о 0,2 № 10	ФК	Гиперчувствительность, детский возраст (до 3 лет).
6.4.	Противогрибковые средства			
	Флуконазол	Капсулы 0,05 № 7, 0,15 № 1, Раствор для инфузий (флаконы) 50мл	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. азольным противогрибковым ЛС в анамнезе), одновременный прием терфенадина (на фоне постоянного приема флуконазола в дозе 400 мг/сут и более) и астемизола, период лактации. С осторожностью Печеночная недостаточность, появление сыпи на фоне применения флуконазола у пациентов с поверхностной грибковой инфекцией и инвазивными/системными грибковыми инфекциями, одновременный прием терфенадина и флуконазола в дозе менее 400 мг/сут, потенциально проаритмогенные состояния у пациентов с множественными факторами риска (органические заболевания сердца, нарушения электролитного баланса, одновременый прием ЛС, вызывающих аритмии), беременность.

	Нистатин	Табл.п/о 500т ЕД № 20	ГГ	Гиперчувствительность.
6.5.	Противопротазойные и противомалярийные средства			
	Гидроксихлорохин	Таблетки п/о 0,2 № 100	ГГ	Гиперчувствительность, беременность (возможно применение по "жизненным" показаниям), период лактации, детский возраст (длительная терапия). С осторожностью Ретинопатия, изменение полей зрения, угнетение костномозгового кроветворения, психозы (в т.ч. в анамнезе), порфирия, псориаз, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гепатит, печеночная и/или почечная недостаточность.
	Метронидазол	Таблетки 0,25 № 10, Раствор для инфузий 0,5%(флаконы) 100мл	ГГ	Гиперчувствительность, лейкопения (в т.ч. в анамнезе), органические поражения ЦНС (в т.ч. эпилепсия), печеночная недостаточность (в случае назначения больших доз), беременность (I триместр), период лактации. С осторожностью Беременность (II-III триместры), почечная/печеночная недостаточность.
6.6.	Противопаразитарные средства			
	Празиквантел	Таблетки п/о 0,6 № 6	ГГ	Гиперчувствительность, беременность (I триместр), период лактации, детский возраст (до 4 лет), цистицеркоз глаз. С осторожностью Печеночная недостаточность, гепатоспленический шистосоматоз.
6.7.	Прочие средства для профилактики и лечения инфекций			
	Бифидумбактерин	Лиоф.порошок для приготовления р-ра для приема внутрь	ГГ	Гиперчувствительность.
6.9.	Иммуноглобулины			
	Иммуноглобулин антирабический		ГГ	Не существует (100% летальность при заболевании бешенством перекрывает любые противопоказания).
	Иммуноглобулин противостолбнячный человека		ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к препаратам крови человека).

	Иммуноглобулин против гепатита В человека		ГГ	гиперчувствительность
6. 10.	Сыворотки			
	Сыворотка противостолбнячная		ГГ	Противопоказание: гиперчувствительность
	Сыворотка противодифтерийная		ГГ	Противопоказание: гиперчувствительность
	Сыворотка противогангренозная		ГГ	Противопоказание: гиперчувствительность
	Сыворотка противоботулиническа		ГГ	Противопоказание: гиперчувствительность
7.	Противоопухолевые, иммунодепрессивные и сопутствующие средства			
7.1.	Цитостатические средства			
	Метотрексат	Таблетки 0,005 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, иммунодефицит, беременность, период лактации. При лечении псориаза и ревматических заболеваний (дополнительно): тяжелое угнетение костномозгового кроветворения, тяжелая печеночная/почечная недостаточность. С осторожностью Асцит, дегидратация, обструктивные заболевания ЖКТ, плевральный или перитонеальный выпот, ХПН, паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы - риск развития тяжелого генерализованного заболевания (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); подагра (в т.ч. в анамнезе) или уратный нефроуролитиаз (в т.ч. в анамнезе), инфекции и воспаление слизистой оболочки полости рта, рвота, диарея (потеря жидкости вследствие выраженной рвоты и диареи может привести к усилению токсичности метотрексата), язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, предшествующая химио- или лучевая терапия, астения.При лечении злокачественных новообразований (дополнительно): ацидурия (pH мочи менее 7), угнетение костномозгового кроветворения.
9.	Средства, влияющие на кровь			
9.1.	Противоанемические средства			

	Железа (111)гидроксид сахарозный комплекс	Раствор для инъекций 2 мл (ампулы) № 5, табл.жев.100мг № 30	ГГ	Гиперчувствительность, анемии не связанные с дефицитом Fe, гиперхроматоз, беременность (I триместр). С осторожностью Печеночная недостаточность, острые инфекционные заболевания, бронхиальная астма, экзема, поливалентная аллергия.
	Железа сульфат+аскорбиновая кислота	Таблетки п/о № 50	ГГ	Гиперчувствительность, повышенное содержание Fe в организме (гемосидероз, гемохроматоз), нарушение утилизации Fe (апластическая анемия), состояние после резекции желудка, кровотечения; детский возраст (до 6 лет - для Тардиферона, до 12 лет - для Сорбифера дурулес). С осторожностью Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
	Фолиевая кислота	Таблетки 0,001 № 50	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Пернициозная анемия и др. мегалобластные анемии с дефицитом цианокобаламина
	Цианокобаламин	Раствор для инъекций 0,5% и 0,2% (ампулы) 1 мл № 10,	ГГ	Гиперчувствительность, тромбоэмболия, эритремия, эритроцитоз, беременность (имеются отдельные указания о возможном тератогенном действии витаминов группы В в высоких дозах), период лактации. С осторожностьюСтенокардия, доброкачественные и злокачественные новообразования, сопровождающиеся мегалобластной анемией и дефицитом витамина В12, склонность к образованию тромбов.
9.2.	Средства, влияющие на систему свертывания крови			
	Алтеплаза	Порошок для приготовления р-ра для инъекций 50мг	ГГ	Гиперчувствительность, геморрагический диатез, одновременный прием непрямых антикоагулянтов, продолжающееся тяжелое или опасное кровотечение (в т.ч. недавно перенесенное), нарушение мозгового кровообращения (внутричерепное кровоизлияние, геморрагический инсульт), в т.ч. в анамнезе за последние 6 мес; новообразования ЦНС и др. локализаций с повышенным риском кровотечения, аневризма сосудов, интракраниальные или спинальные хирургические вмешательства (в анамнезе за последние 2 мес), геморрагическая ретинопатия; в анамнезе (до 10 дней) - тяжелая травма, травматический открытый массаж сердца, акушерское родоразрешение, общие операции, пункции кровеносных сосудов с низким давлением (например, подключичной или яремной вены); тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия, бактериальный эндокардит, перикардит, острый панкреатит, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в течение 3 мес от момента обострения), артериальные или венозные мальформации, печеночная недостаточность, цирроз печени, портальная гипертензия, варикозное расширение вен пищевода, активный гепатит. С осторожностью Недавно перенесенные небольшие травмы (в результате биопсии, пункции сосудов, в/м инъекции, массажа сердца) и др. состояния, сопровождающиеся риском развития кровотечений, беременность, период лактации, пожилой возраст, детский возраст. Учитывая важность тромболитической терапии при состояниях, угрожающих жизни пациента, в случаях, когда ожидаемая польза терапии превышает потенциальный риск, возможно контролируемое применение алтеплазы в уменьшенных дозах, в специализированном стационаре специалистами высокого класса, имеющими опыт проведения тромболитической терапии, несмотря на вышеперечисленные противопоказания.

	Варфарин	Таблетки 0,0025 № 50 и № 100	ГГ	Гиперчувствительность; склонность к кровотечениям (болезнь Виллебранда, гемофилия, тромбоцитопения, нарушения функций тромбоцитов, геморрагический диатез), острый ДВС-синдром, дефицит белков С и S; условия, предрасполагающие к кровотечениям (в т.ч. желудочно-кишечные кровотечения в анамнезе, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки в стадии обострения, дивертикулез, злокачественные опухоли, варикозное расширение вен пищевода, аневризма артерий, люмбальная пункция); недавно перенесенное внутричерепное кровоизлияние (в т.ч. аневризма церебральных артерий, геморрагический инсульт); недавно перенесенные или предполагаемые сложные операции ЦНС, офтальмологические операции и диагностические процедуры; деменция, психоз, алкоголизм и др. состояния, при которых отмечается недостаточная возможность оценки состояния свертывающей системы крови с помощью лабораторных методов; тяжелая артериальная гипертензия.Выраженная почечная и/или печеночная недостаточность, тяжелые заболевания печени или почек; механическая желтуха; инфекционный эндокардит или экссудативный перикардит; сахарный диабет; склонность к падению; беременность (I и III триместр). С осторожностью Пожилой возраст, лихорадка, гипер- или гипотиреоз, декомпенсированная СН, алкоголизм с сопутствующими поражениями печени, ХПН легкой и умеренной степени выраженности, нефротический синдром, умеренная печеночная недостаточность.
	Апиксабан	Таблетки 2,5 мг	ГГ	Гиперчувствительность, клинически значимое кровотечение, заболевание печени, сопровождающееся нарушениями в системе свертывания крови и клинически значимым риском развития кровотечений, тяжелые нарушения функции печени, нарушение функции почек с Cl креатинина менее 15 мл/мин, а также применение у пациентов, находящихся на диализе, возраст до 18 лет, беременность, грудное вскармливание.
	Ривароксабан	Таблетки 10 мг, 20мг	ГГ	Противопоказания:Тяжелая реакция гиперчувствительности на ривароксабан (например, анафилактическая реакция) , активные патологические кровотечения

	Дабигатран	Капсулы 150 мг	ГГ	:известная чувствительность к дабигатрану или дабигатрану этексилату или к любому из вспомогательных веществ; почечная недостаточность тяжелой степени (КК <30 мл/мин); активное клинически значимое кровотечение; поражение органов в результате клинически значимого кровотечения, включая геморрагический инсульт в течение предыдущих 6 мес до начала терапии; наличие состояний, при которых повышен риск больших кровотечений, в т.ч. имеющиеся или недавние изъязвления ЖКТ, наличие злокачественных образований с высоким риском кровотечения, недавнее повреждение головного или спинного мозга, недавняя операция на головном или спинном мозге или офтальмологическая операция, недавнее внутричерепное кровоизлияние, наличие или подозрение на варикозно-расширенные вены пищевода, врожденные артериовенозные дефекты, сосудистые аневризмы или большие внутрипозвоночные или внутримозговые сосудистые аномалии; одновременное назначение любых других антикоагулянтов, в т.ч. нефракционированного гепарина, низкомолекулярных гепаринов (включая эноксапарин, далтепарину), производные гепарина(включая фондапаринукс), пероральных антикоагулянтов (включая варфарин, ривароксабан, апиксабан), за исключением случаев перехода лечения с или на препарат Прадакса® или в случае применения нефракционированного гепарина в дозах, необходимых для поддержания центрального венозного илитериального катетера или при выполнении катетерной аблации при фибрилляции предсердий; одновременное назначение мощных ингибиторов Р-гликопротеина: кетоконазола для системного применения, циклоспорина, итраконазола, такролимуса и дронедарона; нарушения функции печени и заболевания печени, которые могут повлиять на выживаемость; наличие протезированного клапана сердца при необходимости антикоагулянтной терапии; возраст до 18 лет (клинические данные отсутствуют).
	Аминокапроновая кислота	Раствор для инфузий 5% (флаконы) 100мл	ГГ	Гиперчувствительность, гиперкоагуляция (тромбообразование, тромбоэмболия), склонность к тромбозам и тромбоэмболическим заболеваниям, нарушения мозгового кровообращения, ДВС-синдром, беременность. С осторожностью Артериальная гипотензия, клапанные пороки сердца, гематурия, кровотечение из верхних мочевыводящих путей неустановленной этиологии, печеночная недостаточность, ХПН.
	Дипиридамол	Таблетки 0,025 № 0,075 № 40	ГГ	Гиперчувствительность, острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, распространенный стенозирующий атеросклероз коронарных артерий, субаортальный стеноз, декомпенсированная ХСН, артериальная гипотензия, коллапс, тяжелая аритмия, геморрагический диатез, заболевания со склонностью к кровотечениям (в т.ч. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки), печеночная и/или почечная недостаточность, детский возраст (до 12 лет). Для ЛФ, содержащих лактозу (дополнительно): непереносимость лактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.Для применения в качестве диагностического ЛС: гиперчувствительность, детский возраст (до 14 лет). С осторожностьюБеременность, период лактации.
	Этамзилат	Раствор для инъекций 0,25% (ампулы) 2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, тромбоз, тромбоэмболия, острая порфирия. С осторожностьюПри кровотечениях на фоне передозировки антикоагулянтов.

	Гепарин натрий	Флаконы 5000ЕД/мл 5мл	ГГ	Гиперчувствительность к гепарину, заболевания, сопровождающиеся повышенной кровоточивостью (гемофилия, тромбоцитопения, васкулит и др.), кровотечение, аневризма сосудов головного мозга, расслаивающая аневризма аорты, геморрагический инсульт, антифосфолипидный синдром, травма (особенно черпно-мозговая), неконтролируемая артериальная гипертензия, эрозивно-язвенные поражения ЖКТ; цирроз печени, сопровождающийся варикозным расширением вен пищевода; менструальный период, угрожающий выкидыш, роды (в т.ч. недавние), недавно проведенные хирургические вмешательства на глазах, мозге, предстательной железе, печени и желчных путях, состояние после пункции спинного мозга, беременность, период лактации. С осторожностью Лицамс поливалентной аллергией (в т.ч. бронхиальная астма), артериальная гипертензия, стоматологические манипуляции, сахарный диабет, эндокардит, перикардит, ВМК, активный туберкулез, лучевая терапия, печеночная недостаточность, ХПН, пожилой возраст (старше 60 лет, особенно женщины).
	Надропарин кальций	шприц 0,8мл и 0,6мл № 10	ФК	Гиперчувствительность, острый бактериальный эндокардит, тромбоцитопения (у лиц с положительным тестом агрегации in vitro в присутствии препарата), кровоточивость (кроме ДВС-синдрома), геморрагический инсульт, перикардит, васкулит, артериальная гипертензия, ортостатическая гипотензия, обморочные состояния, хориоретинопатия, обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, тяжелая почечная/печеночная недостаточность, тяжелый сахарный диабет, травмы ЦНС, состояние после спинномозговой пункции, проведение лучевой терапии, использование ВМК, беременность, период лактации, послеродовой период.
	Эноксапарин натрий	Шприц 0,4мл № 10, шприц 0,6мл № 2	ГГ	Гиперчувствительность, угрожающий аборт, аневризма сосудов головного мозга или расслаивающая аневризма аорты (за исключением хирургического вмешательства), геморрагический инсульт (установленный или подозреваемый), кровотечение неконтролируемое, тяжелая неконтролируемая артериальная гипертензия, тяжелая тромбоцитопения, индуцированная гепарином и эноксапарином натрия (на протяжении последних месяцев). С осторожностьюПроведение спинальной или эпидуральной анестезии (потенциальная опасность развития гематомы), состояния, связанные с опасностью кровотечения - нарушения в системе свертывания крови (в т.ч. гемофилия, тромбоцитопения, гипокоагуляция, болезнь Виллебранда и др.), недавние роды, тяжелый сахарный диабет, эндокардит бактериальный (острый или подострый), язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки или др. эрозивно-язвенные поражения ЖКТ, ВМК, неврологическая или офтальмологическая операция (недавно перенесенная или предполагаемая), перикардит или перикардиальный выпот, лучевая терапия (недавно перенесенная), почечная и/или печеночная недостаточность, диабетическая или геморрагическая ретинопатия, спинномозговая пункция (недавно перенесенная), тяжелая травма (особенно ЦНС), активный туберкулез, заболевания дыхательной системы или мочевыводящего тракта (активные), тяжелый васкулит, открытые раны на больших поверхностях, артериальная гипертензия.
	Протамина сульфат	Раствор для инъекций 2% (ампулы) 2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, идиопатическая или врожденная гипергепаринемия (в таких случаях препарат неэффективен и может усилить кровоточивость), выраженная артериальная гипотензия, тромбоцитопения, недостаточность коры надпочечников, предшествующее введение инсулинов и др. ЛС, содержащих в составе протамина сульфат, аллергические реакци на рыбу в анамнезе.

	Клопидогрел	Таблетки п/о 0,0075 №28, №14 и № 90	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая печеночная недостаточность, острое кровотечение (в т.ч. кровотечение из пептической язвы или внутричерепное кровоизлияние), беременность и период лактации, детский возраст до 18 лет. Для ЛФ, содержащих лактозу (дополнительно): непереносимость лактозы, дефицит лактазы и синдром глюкозо-галактозной мальабсорбции. С осторожностью Умеренная печеночная недостаточность, ХПН, патологические состояния, повышающие риск развития кровотечения (в т.ч. травма, операции), склонность к кровотечениям, одновременный прием АСК, варфарина, НПВП (включая ингибиторы ЦОГ-2), гепарина и ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa, наследственное снижение функции изофермента CYP2C19.
9.3.	Растворы и плазмозаменители.			
	«Гепасол А»	Раствор для инфузий(флаконы) 500мл	ГГ	Гиперчувствительность, острые нарушения гемодинамики (в т.ч. шок травматический, операционный, ожоговый, массивная кровопотеря), ХСН, геморрагический инсульт, печеночная и/или почечная недостаточность, нарушение аминокислотного обмена, гипергидратация; тромбоэмболия.
	Декстроза	Раствор для инъекций(ампулы)40 % 10мл № 10, Раствор для инфузий 5%(флаконы) 200мл и 250мл	ГГ	Гиперчувствительность, гипергликемия, гиперлактацидемия, гипергидратация, послеоперационные нарушения утилизации глюкозы; циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; отек мозга, отек легких, острая левожелудочковая недостаточность, гиперосмолярная кома, детский возраст (для растворов свыше 20-25%). С осторожностью Декомпенсированная ХСН, ХПН (олиго-, анурия), гипонатриемия, сахарный диабет.
	Декстран	Раствор для инфузий (флаконы)200мл	ГГ	Гиперчувствительность, кровоточивость, тромбоцитопения; декомпенсированная ХСН (опасность развития отека легких); почечная недостаточность (олиго-, анурия). Электрофорез противопоказан при мацерации кожи век, обильном слизисто-гнойном отделяемом.
	Инфезол 40	Раствор для инфузий (флаконы)250мл	ГГ	Нарушение обмена аминокислот, гиперкалиемия, почечная недостаточность, декомпенсированная ХСН.

	Гидроксиэтилкрахмал	Раствор для инфузий 6% (флаконы) 250 мл и 500мл	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к крахмалу), внутричерепная гипертензия, артериальная гипертензия, внутричерепное кровотечение, декомпенсированная ХСН, острая почечная недостаточность (олиго-, анурия), отек легких (в т.ч. кардиогенный), гипергидратация (включая отек легкого), гиперволемия, дегидратация (при необходимости коррекции электролитного обмена), выраженные нарушения свертывающей системы крови (в т.ч. тяжелый геморрагический диатез, гипокоагуляция, гипофибриногенемия), гиперхлоремия, гипернатриемия, гипокалиемия, гемодиализ, тяжелая печеночная недостаточность; беременность. С осторожностью Компенсированная ХСН и ХПН, хронические заболевания печени, болезнь Виллебранда, геморрагический диатез, гипофибриногенемия, печеночная недостаточность, хронические заболевания печени; гиперосмолярность; возраст до 2 лет, период лактации.Дополнительно для ГЭК с содержанием NaCl 72 г: возраст до 10 лет.
9.4.	Препараты крови			
	Альбумин	Раствор для инфузий 10%(флаконы) 100мл	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая анемия, ХСН II-III ст., гиперволемия, отек легких. С осторожностью Артериальная гипертензия, почечная недостаточность, тромбоз, продолжающееся внутреннее кровотечение, ХСН.
9.5.	Гиполипидемические средства			
	Симвастатин	Таблетки п/о 0,02 № 20,№28 табл. п/о 0,04 № 14	ГГ	Гиперчувствительность, острые заболевания печени, повышение активности "печеночных" трансаминаз неясного генеза; беременность; период лактации. С осторожностью Алкоголизм, заболевания печени в анамнезе; состояния с высоким риском вторичной почечной недостаточности и рабдомиолиза - тяжелые нарушения электролитного баланса, эндокринные и метаболические нарушения, артериальная гипотензия, тяжелые острые инфекции, миопатия, неконтролируемые судороги, обширные хирургические вмешательства, травма, состояния после трансплантации органов на фоне иммунодепрессивной терпии; возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не изучены).
	Аторвастатин	Таблеткип/о 0,04 и 0,02 № 30,	ГГ	Гиперчувствительность, активные заболевания печени, повышение активности "печеночных" трансаминаз (более чем в 3 раза) неясного генеза, беременность, период лактации, женщины репродуктивного возраста, не пользующиеся адекватными методами контрацепции, детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Алкоголизм, заболевания печени в анамнезе.

	Розувастатин	Таблетки 0,02 № 28, табл.0,01 № 28	ФК	Гиперчувствительность, заболевания печени в активной фазе (в т.ч. стойкое повышение активности «печеночных» трансаминаз, а также любое повышение активности «печеночных» трансаминаз в сыворотке крови более чем в 3 раза по сравнению с верхней границей нормы), выраженные нарушения функции почек (КК<30 мл/мин), миопатия, одновременный прием циклоспорина, беременность, период лактации; женщины репродуктивного возраста, не пользующиеся адекватными методами контрацепции; возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Почечная недостаточность, гипотиреоз, личный или семейный анамнез наследственных мышечных заболеваний и предшествующий анамнез мышечной токсичности при использовании др. ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы или фибратов), алкогольная зависимость, возраст старше 65 лет, заболевания печени в анамнезе, сепсис, артериальная гипотензия, обширные хирургические вмешательства, травмы, тяжелые метаболические, эндокринные или электролитные нарушения, протеинурия, неконтролируемая эпилепсия, азиаты (японцы и китайцы).
10.	Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему			
	Изосорбид динитрат	Таблетки 0,025 № 50,0,04 № 50,№ 20,таблетки 0,06 № 50 Раствор для инъекций 0,1% (ампулы) 10 мл № 10,	ГГ	Гиперчувствительность, острое нарушение кровообращения (шок, коллапс), кардиогенный шок (если не проводятся мероприятия по поддержанию конечного диастолического давления), ГОКМП, констриктивный перикардит, тампонада сердца, артериальная гипотензия (САД менее 90 мм рт.ст.), гиповолемия, тяжелая анемия, тяжелый аортальный и субаортальный стеноз, тяжелый митральный стеноз, кровоизлияние в мозг, закрытоугольная глаукома; одновременный прием ингибиторов ФДЭ-5 (в т.ч. силденафила, варденафила в предшествующие 24 ч, тадалафила в предшествующие 48 ч и более). С осторожностью Низкое давление наполнения ЛЖ, в т.ч. при остром инфаркте миокарда, ЛЖ недостаточности; аортальный или митральный стеноз легкой и средней степени; заболевания, сопровождающиеся повышенным внутричерепным давлением; ортостатическая гипотензия, тяжелая почечная и/или печеночная недостаточность, гипотиреоз, недостаточное и неполноценное питание; беременность, период лактации.
	Изосорбид мононитрат	Таблетки 0,04 и 0,02 № 30,0,04 и 0,06 № капс.рет.0,05 №30, табл.лонг 0,05№ 30, табл.рет.0,1 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, острые нарушения кровообращения (шок, коллапс), кардиогенный шок, при невозможности коррекции конечного диастолического давления ЛЖ с помощью внутриаортальной контрпульсации или за счет введения ЛС, оказывающих положительное инотропное действие, тяжелая артериальная гипотензия (САД менее 90 мм рт.ст.), гиповолемия, тяжелая анемия, констриктивный перикардит, тампонада сердца, ГОКМП, тяжелый аортальный и субаортальный стеноз, тяжелый митральный стеноз, кровоизлияние в мозг, одновременный прием с ингибиторами ФЭД-5, детский возраст. С осторожностью Для всех ЛФ: состояния, сопровождающиеся повышением внутричерепного давления, острый инфаркт миокарда (риск снижения АД и тахикардии, которые могут усилить ишемию), ХСН, митральный/аортальный стеноз легкой или средней степени тяжести, закрытоугольная глаукома (риск повышения внутриглазного давления), артериальная гипотензия с низким систолическим АД (может усугубить состояние, вызвав парадоксальную брадикардию и приступы стенокардии), тяжелая почечная недостаточность, печеночная недостаточность (риск развития метгемоглобинемии), недостаточное или неполноценное питания, беременность, период лактации.Для пролонгированных ЛФ для приема внутрь (дополнительно) - повышенная перистальтика ЖКТ, синдром мальабсорбции.
	Нитроглицерин	Таблетки 0,0005 №	ГГ	Гиперчувствительность, одновременное применение ингибиторов ФДЭ-5.

		раствор для инъекций 0,1%(ампулы) 10 мл № 10 аэрозоль 10,0		С осторожностью Для всех форм (сопоставляя риск и пользу) - геморрагический инсульт, внутричерепная гипертензия, острый инфаркт миокарда с низким давлением заполнения ЛЖ (риск снижения АД и тахикардии, которые могут усилить ишемию), ХСН с низким давлением заполнения ЛЖ, глаукома (риск повышения внутриглазного давления), тяжелая анемия, тиреотоксикоз, артериальная гипотензия с низким систолическим АД (может усугубить состояние, вызвав парадоксальную брадикардию и приступы стенокардии), ГКМП (возможно учащение приступов стенокардии), тяжелая почечная недостаточность, печеночная недостаточность (риск развития метгемоглобинемии), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (безопасность применения не установлена).Для пролонгированных лекарственных форм для приема внутрь (дополнительно) - повышенная перистальтика ЖКТ, синдром мальабсорбции.Для в/в введения (дополнительно): ЧМТ (повышает внутричерепное давление), тампонада сердца, констриктивный перикардит, гиповолемия (должна быть скорректирована перед использованием нитроглицерина - риск выраженного снижения АД), токсический отек легких, атеросклероз.
	Верапамил	Таблетки п/о 0,04 и 0,08 № 50,табл. пролонг.п/о 0,24 № 30 раствор для инъекций0,25% (ампулы) 2 мл № 10,.0,005/2мл№ 5,	ГГ	Гиперчувствительность, выраженная дисфункция ЛЖ, артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст.) или кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., СССУ (кроме больных с кардиостимулятором), трепетание и фибрилляция предсердий и WPW-синдром или синдром Лауна-Ганонга-Левина (кроме больных с кардиостимулятором), одновременный прием колхицина, беременность, период лактации. С осторожностью AV блокада I ст., брадикардия, ИГСС, ХСН, печеночная и/или почечная недостаточность, замедление нервно-мышечной передачи, пожилой возраст, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не исследованы
	Триметазидин	Таблетки п/о 0,035 № 60, 0,02 № 30	ФК	Гиперчувствительность, ХПН (КК менее 15 мл/мин), беременность, период лактации, детский возраст.
	Раствор ментола 25% в ментиловом эфире изовалериановой кислоты	Таблетки 0,05 № 10	ФК	Гиперчувствительность. С осторожностью Сахарный диабет (для ЛФ, содержащих сахар).
	Мельдоний	Раствор для инъекций 10%(ампулы) 5мл № 10, капсулы 0,5	ГГ	Гиперчувствительность, повышение внутричерепного давления (при нарушении венозного оттока и внутричерепных опухолях), беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью Хронические заболевания печени и почек.
	Амиодарон	Таблетки 0,2 № 30,	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к йоду), СССУ (синусовая брадикардия, SA блокада) в отсутствии

		раствор для инъекций 0,15/3 мл № 6		кардиостимулятора, нарушение внутрижелудочковой проводимости (двух-, трехпучковые блокады) в отсутствии кардиостимулятора, AV блокада II-III ст. (без использования кардиостимулятора), кардиогенный шок, гипокалиемия, гипомагниемия, коллапс, выраженная артериальная гипотензия, гипотиреоз, гипертиреоз, врожденное или приобретенное удлинение интервала Q-T, одновременный прием ЛС, удлиняющих интервал Q-T и вызывающих пароксизмальную тахикардию (в т.ч. полиморфную желудочковую типа "пируэт"), беременность, период лактации, возраст до 18 лет.При проведении кардиореанимации при остановке сердца, вызванной фибрилляцией желудочка, резистентной к кардиоверсии, абсолютных противопоказаний нет. С осторожностью ХСН (III-IV ФК по классификации NYHA), AV блокада I ст., печеночная недостаточность, бронхиальная астма, пожилой возраст (высокий риск развития тяжелой брадикардии).
	Прокаинамид	Раствор для инъекций 10%(ампулы) 10 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, AV блокада II-III ст. (за исключением случаев применения электрокардиостимулятора), трепетание или мерцание желудочков, аритмии на фоне интоксикации сердечными гликозидами, лейкопения, детский возраст (до 18 лет). С осторожностью Инфаркт миокарда, блокада ножек пучка Гиса, миастения, печеночная и/или почечная недостаточность, СКВ (в т.ч. в анамнезе), бронхиальная астма, декомпенсированная ХСН, желудочковая тахикардия при окклюзии коронарной артерии, хирургические вмешательства (в т.ч. хирургическая стоматология), удлинение интервала Q-T, артериальная гипотензия, выраженный атеросклероз, миастения, пожилой возраст.
	Пропафенон	Таблетки п/о 0,15 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, AV блокада II-III ст. (без электрокардиостимулятора), внутрижелудочковая бифасцикулярная блокада (без электрокардиостимулятора), кардиогенный шок, синусовая брадикардия, ХСН, СССУ, период лактации. С осторожностью Бронхиальная астма, гипо- и гиперкалиемия, КМП, артериальная гипотензия, миастения, ХОБЛ, печеночный холестаз, больным с постоянным или временным кардиостимулятором; печеночная и/или почечная недостаточность, комбинация с др. антиаритмическими ЛС, аналогичными по влиянию на электрофизиологию сердца, беременность, детский возраст.
	Атропин	Раствор для инъекций 0,1% (ампулы) 1 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Заболевания ССС, при которых увеличение ЧСС может быть нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, ХСН, ИБС, митральный стеноз, артериальная гипертензия, острое кровотечение;тиреотоксикоз (возможно усиление тахикардии);повышенная температура тела (может еще повышаться вследствие подавления активности потовых желез);рефлюкс-эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс-эзофагитом (снижение моторики пищевода и желудка и расслабление нижнего пищеводного сфинктера могут способствовать замедлению опорожнения желудка и усилению гастроэзофагеального рефлюкса через сфинктер с нарушенной функцией);
	Метопролол	Табл.0,05 № 50, табл.0,025 № 50, табл.п/о 0,1 № 50, табл.рет.п/о 0,05 № 30,	ГГ ФК	Гиперчувствительность, кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., SA блокада, СССУ, синусовая брадикардия (ЧСС менее 50/мин), декомпенсированная ХСН, стенокардия Принцметала, артериальная гипотензия для вторичной профилактики инфаркта миокарда (САД менее 100 мм рт.ст., ЧСС менее 45 уд/мин), феохромоцитома (без одновременного применения альфа-адреноблокаторов), одновременный прием ингибиторов МАО или одновременное в/в введение верапамила; детский возраст (эффективность и безопасность не установлены), период лактации.

		амп.1мг/мл 5мл № 5		С осторожностью Сахарный диабет, метаболический ацидоз, бронхиальная астма, ХОБЛ, почечная/печеночная недостаточность, миастения, феохромоцитома (при одновременном применении с альфа-адреноблокаторами), тиреотоксикоз, AV блокада I ст., депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, облитерирующие заболевания периферических сосудов ("перемежающаяся" хромота, синдром Рейно), беременность, пожилой возраст
	Атенолол	Табл.0,1 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., брадикардия с ЧСС менее 40/мин, СССУ, SA блокада, острая СН или декомпенсированная ХСН, кардиомегалия без признаков ХСН, стенокардия Принцметала, артериальная гипотензия (в случае применения при инфаркте миокарда, систолическое АД менее 100 мм рт.ст.), одновременный прием ингибиторов МАО; период лактации, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Сахарный диабет, метаболический ацидоз, гипогликемия; аллергические реакции в анамнезе, ХОБЛ, бронхиальная астма, эмфизема легких; ХСН (компенсированная), облитерирующие заболевания периферических сосудов ("перемежающаяся" хромота, синдром Рейно); феохромоцитома, печеночная недостаточность, ХПН, миастения, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, беременность, пожилой возраст, детский возраст (эффективность и безопасность не установлены).
	Пропранолол	Табл.0,04 № 50, амп.0,5% 2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, острая СН, кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., синусовая брадикардия (ЧСС менее 55/мин), артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда). С осторожностью Бронхиальная астма, ХОБЛ, бронхит, декомпенсированная сердечная недостаточность, сахарный диабет, почечная и/или печеночная недостаточность, гипертиреоз, депрессия, миастения, феохромоцитома, псориаз, окклюзионные заболевания периферических сосудов, беременность, период лактации, пожилой возраст, детский возраст (эффективность и безопасность не определены).
	Ивабрадин	Таблетки п/о 0,005 № 14	ГГ	Противопоказания Гиперчувствительность, ЧСС в покое ниже 60/мин (до начала лечения), кардиогенный шок, острый инфаркт миокарда, выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст. и диастолическое АД ниже 50 мм рт.ст.), тяжелая печеночная недостаточность (более 9 по классификации Чайлд-Пьюга), СССУ, SA-блокада, ХСН III-IV ст. (по классификации NYHA - отсутствие клинического опыта), искусственный водитель ритма, нестабильная стенокардия, AV-блокада II-III ст., острое нарушение мозгового кровообращения, одновременный прием сильных ингибиторов цитохрома P450 CYP3A4 (в т.ч. кетоконазол, итраконазол, кларитромицин, эритромицин, джозамицин, телитромицин, нелфинавир, ритонавир, нефазодон); непереносимость галактозы, дефицит лактазы, глюкозо-галактозная недостаточность (для ЛФ, содержащих лактозу), беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Асимптоматическая дисфункция ЛЖ, ХСН II ст. (по классификации NYHA), пигментная дегенерация сетчатки, мягкая и умеренная степень артериальной гипотензии, умеренно выраженная печеночная недостаточность, тяжелая ХПН (КК менее 15 мл/мин).

	Амлодипин	Табл.0,01 № 30,№ 20;0,005 № 30	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. дигидропиридинам), выраженная артериальная гипотензия (САД менее 90 мм рт.ст.), беременность, период лактации. С осторожностью Артериальная гипотензия, аортальный стеноз, ХСН неишемической этиологии (III-IV класс по NYHA), печеночная недостаточность, острый инфаркт миокарда (и в течение 1 мес после), ГОКМП, СССУ, возраст до 18 лет, пожилой возраст.
	Нифедипин	Таблетки 0,01 № табл.рет.0,02 № 50,№ табл.ХЛ 0,04 № 20, табл. ХЛ п/о 0,03 № Раствор для инъекций (ампулы) 5мл № 5 Таблетки с контролир. высвобождением 0,6 № 28	ГГ	Гиперчувствительность, артериальная гипотензия (систолическое АД ниже 90 мм рт.ст.), кардиогенный шок, коллапс, выраженный аортальный или субаортальный стеноз, нестабильная стенокардия, острый период инфаркта миокарда (в течение первых 4 нед), СССУ, AV блокада II-III ст., беременность (до 20 нед), период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не исследованы). С осторожностью Аортальный стеноз (особенно при одновременном применении с бета-адреноблокаторами), митральный стеноз, ГОКМП, выраженная брадикардия или тахикардия, ХСН, тяжелые нарушения мозгового кровообращения, инфаркт миокарда с ЛЖ недостаточностью, непроходимость ЖКТ (для форм с замедленным высвобождением), печеночная недостаточность, ХПН (особенно больные, находящиеся на гемодиализе - высокий риск чрезмерного и непрогнозируемого снижения АД), одновременный прием бета-адреноблокаторов и сердечных гликозидов, беременность (после 20 нед), пожилой возраст.
	Каптоприл	Табл.0,025 № 28, №	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. ингибиторам АПФ), ангионевротический отек (в анамнезе на фоне терапии ингибиторами АПФ или наследственный), выраженная почечная/печеночная недостаточность, гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки с прогрессирующей азотемией, состояние после трансплантации почки, ИГСС, заболевания и состояния с затруднением оттока крови из ЛЖ, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностьюТяжелые аутоиммунные заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения (риск развития нейтропении и агранулоцитоза), ишемия головного мозга, сахарный диабет (риск развития гиперкалиемии), пациенты, находящиеся на гемодиализе, диета с ограничением Na+, первичный гиперальдостеронизм, ИБС, состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст.
	Эналаприл	Раствор для инъекций (ампулы)1,25мг/мл 1,0 № 5, таблетки 0.01 № 20,№ 14 табл.0.02 № 14, № 20,	ГГ	Гиперчувствительность к эналаприлу или др. ингибиторам АПФ, беременность, период лактации. С осторожностью Ангионевротический отек в анамнезе на фоне терапии ингибиторами АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, аортальный стеноз, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ИБС, коронарная недостаточность, тяжелые аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения, сахарный диабет, гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, состояние после трансплантации почки, почечная и/или печеночная недостаточность, диета с ограничением Na+, состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не изучены). Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным сульфонамида), анурия, ангионевротический отек в анамнезе,

	Эналаприл+индапамид	Табл.0,01/12,5 и 0,02/12,5 №20		связанный с приемом ингибиторов АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, беременность, период лактации, детский возраст. С осторожностью Почечная/печеночная недостаточность, тяжелые системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, склеродермия), двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, состояние после трансплантации почки, аортальный стеноз, ХСН, ИБС, угнетение костномозгового кроветворения, цереброваскулярные болезни (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), сахарный диабет, гиперкалиемия, диета с ограничением Na+, состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст.
	Фозиноприл	Таблетки 0,01 и	ФК	Гиперчувствительность к фозиноприлу, беременность, период лактации. С осторожностью Ангионевротический отек в анамнезе на фоне терапии ингибиторами АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек, аортальный стеноз, церебро- и кардиоваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения, ИБС, коронарная недостаточность), тяжелые аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения, сахарный диабет, гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, состояние после трансплантации почек, печеночная недостаточность, диета с ограничением Na+, состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не изучены
	Валсартан+сакубитрил	Таблетки 50мг №28	ГГ	Противопоказания:Повышенная чувствительность к сакубитрилу или к валсартану; одновременное применение с ингибиторами АПФ, а также период в течение 36 ч после отмены ингибиторов АПФ; наличие ангионевротического отека в анамнезе на фоне предшествующей терапии ингибиторами АПФ или АРА II; одновременное применение с алискиреном у пациентов с сахарным диабетом или пациентов с умеренным или тяжелым нарушением функции почек (рСКФ <60 мл/мин/1,73 м2); нарушение функции печени тяжелой степени (класс С по классификации Чайлд-Пью), билиарный цирроз и холестаз; возраст до 18 лет в связи с отсутствием данных по эффективности и безопасности; беременность, планирование беременности и период грудного вскармливания; одновременное применение с другими ЛС, содержащими АРА II, т.к. в состав ЛС входит валсартан.
	Валсартан	Табл.п/о 0,16 №28, табл.п/о 0,08 №28 и № 98 табл.п/о 0,16мг № 98	ФК	Гиперчувствительность; беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью Печеночная недостаточность на фоне непроходимости желчных путей; почечная недостаточность (КК менее 10 мл/мин), в т.ч. пациенты, находящиеся на гемодиализе, диета с ограничением потребления натрия, стеноз почечной артерии (двусторонний или единственной почки), состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота).

	Вальсартан+гидрохлор тиазид	Табл.п/о 0,16№ 98 Табл.0,08 № 98	ФК	Гиперчувствительность; беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью Печеночная недостаточность на фоне непроходимости желчных путей; почечная недостаточность (КК менее 10 мл/мин), в т.ч. пациенты, находящиеся на гемодиализе, диета с ограничением потребления натрия, стеноз почечной артерии (двусторонний или единственной почки), состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота).
	Лаппаконитина гидробромид	Табл.п/о 0,025 № 30, амп. 0,5% 2мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, SA блокада II ст., AV блокада II-III ст. (без кардиостимулятора), блокада правой ножки пучка Гиса, сочетающаяся с блокадой одной из ветвей левой ножки, блокада внутрижелудочковой проводимости, ХСН, тяжелая артериальная гипотензия, кардиогенный шок, выраженная гипертрофия ЛЖ (толщина стенки более 1.4 см), постинфарктный кардиосклероз, тяжелая почечная/печеночная недостаточность, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью СССУ, брадикардия, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы, AV блокада I ст., нарушение проводимости по волокнам Пуркинье, блокада одной из ножек пучка Гиса, нарушение электролитного баланса (гипокалиемия, гиперкалиемия, гипомагниемия).
	Лизиноприл	Таблетки0,01 и 0,02 Табл.0,02 и 0,01 № 28,	ГГ	Гиперчувствительность, в т.ч. к др. ингибиторам АПФ, ангионевротический отек в анамнезе, в т.ч. на фоне применения ингибиторов АПФ, наследственный отек Квинке или идиопатический отек, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Аортальный стеноз, цереброваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения), ИБС, коронарная недостаточность, тяжелые аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения, сахарный диабет, гиперкалиемия, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, состояние после трансплантации почек, почечная недостаточность, азотемия, первичный альдостеронизм, ГОКМП, артериальная гипотензия, диета с ограничением соли, состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст.
	Небиволол	Таблетки 0,005 № 14	ФК	Гиперчувствительность; декомпенсированная ХСН, острая СН, кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., СССУ, брадикардия (ЧСС менее 50/мин), SA блокада, AV блокада II-III ст., артериальная гипотензия; феохромоцитома; ХОБЛ, бронхиальная астма; облитерирующие заболевания периферических сосудов ("перемежающаяся" хромота); миастения, мышечная слабость; депрессия; метаболический ацидоз, выраженная печеночная недостаточность; возраст до 18 лет, период лактации.Для ЛФ, содержащих лактозу (дополнительно): непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью Почечная недостаточность, AV блокада I ст., стенокардия Принцметала, сахарный диабет, псориаз, гипертиреоз, аллергические заболевания, пожилой возраст (старше 65 лет), беременность.
	Соталол	Таблетки 0,08 и 0,16	ГГ	Гиперчувствительность, острая СН или декомпенсированная ХСН, кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., SA

		Раствор для инъекций (ампулы)10мг/мл 4мл №10,		блокада, СССУ, синусовая брадикардия (ЧСС менее 55/мин), стенокардия Принцметала, кардиомегалия (без признаков СН), артериальная гипотензия (систолическое АД менее 90 мм рт.ст., особенно при инфаркте миокарда); ХОБЛ, бронхиальная астма (тяжелого течения); окклюзионные заболевания периферических сосудов (осложненные гангреной, "перемежающейся" хромотой или болью в покое), сахарный диабет с кетоацидозом, метаболический ацидоз, одновременный прием ингибиторов МАО, период лактации. С осторожностью Аллергические реакции в анамнезе, ХСН, феохромоцитома, печеночная недостаточность, ХПН, синдром Рейно, миастения, тиреотоксикоз, депрессия (в т.ч. в анамнезе), псориаз, гипокалиемия, удлинение интервала Q-T, беременность, пожилой возраст, детский возраст.
	Клонидин	Раствор для инъекций (ампулы) 0,1мг/мл 1 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, выраженная синусовая брадикардия, СССУ, AV блокада II-III ст., беременность, период лактации, детский возраст. С осторожностью Депрессия (в т.ч. в анамнезе), ИБС (особенно недавно перенесенный инфаркт миокарда), тяжелая ХСН, цереброваскулярные заболевания, нарушения внутрисердечной проводимости (в т.ч. брадиаритмия легкой и средней степени), нарушение периферического кровообращения, полинейропатия, запор, ХПН, одновременный прием с трициклическими антидепрессантами, сахарный диабет.
	Лозартан Лозартан+гидрохлортиазид	Таблетки п/о 0,05 № 30 Таблетки п/о 0,05/0,0125 № 28	ГГ ФК	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, детский возраст. С осторожностью Артериальная гипотензия, нарушение водно-электролитного баланса, снижение ОЦК, почечная/печеночная недостаточность.
	Ирбесартан Ирбесартан+гидрохлортиа-зид	Таблетки 0,3 №14, табл.0,15/12,5 № 28	ФК	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, возраст до 18 лет. С осторожностью ХСН, ГОКМП, стеноз аортального или митрального клапана, дегидратация, гипонатриемия, гемодиализ, гипосолевая диета, диарея, рвота, односторонний или двусторонний стеноз почечной артерии, почечная недостаточность.
	Азаметония бромид	Раствор для инъекций (ампулы)5% 1 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, артериальная гипотензия, шок, острый инфаркт миокарда, закрытоугольная глаукома, печеночная недостаточность, ХПН. С осторожностью Атония кишечника и мочевого пузыря различной этиологии, тромбозы, тромбофлебит, дегенеративные заболевания ЦНС, бронхиальная астма (с затруднением отхождения мокроты), пожилой возраст.
	Индапамид	Таблетки п/о 0,0025 табл.рет.п/о 0,0015 мг № 30 капсулы0,0025 № 30,	ГГ	Гиперчувствительность, тяжелая печеночная недостаточность (в т.ч. с энцефалопатией), гипокалиемия, период лактации, детский возраст до 18 лет.Непереносимость лактозы, галактоземия, синдром нарушения всасывания глюкозы/галактозы - для ЛФ, содержащих лактозу. С осторожностью Нарушения водно-электролитного обмена, печеночная и/или почечная недостаточность, удлинение интервала Q-T или одновременный прием ЛС, удлиняющих интервал Q-T, беременность, гиперурикемия (особенно проявляющаяся подагрой или уратным нефролитиазом), гиперпаратиреоз.
	Периндоприл	Табл.0,005, 0,008,и 0,01 № 30	ГГ ФК	Гиперчувствительность к периндоприлу или др. ингибиторам АПФ, беременность, период лактации. С осторожностью Ангионевротический отек в анамнезе на фоне терапии ингибиторами АПФ, наследственный или идиопатический ангионевротический отек.Аортальный стеноз, церебро- и кардиоваскулярные заболевания (в т.ч. недостаточность мозгового кровообращения, ИБС, коронарная недостаточность - опасность развития чрезмерного снижения АД и сопутствующей ишемии).Тяжелые аутоиммунные системные заболевания

	Периндоприл+индапам	таблетки 0,002/0,625 0,004/1,25 , 0,008+0,025 № 30		чрезмерного снижения АД и сопутствующей ишемии).Тяжелые аутоиммунные системные заболевания соединительной ткани (в т.ч. СКВ, склеродермия), угнетение костномозгового кроветворения на фоне приема иммунодепрессантов (повышение вероятности развития нейтропении).Сахарный диабет (возможно усиление действия гипогликемических ЛС).Двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз артерии единственной почки, состояние после трансплантации почек (риск развития нарушения функции почек и агранулоцитоза), ХПН (особенно сопровождающаяся гиперкалиемией), диета с ограничением Na+, состояния, сопровождающиеся снижением ОЦК (в т.ч. диарея, рвота), пожилой возраст, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не изучены).
	Бисопролол	Табл.п/о 0,005 № 30 и № 90 и 0,01№ 30	ГГ	Гиперчувствительность, острая СН или декомпенсированная ХСН, кардиогенный шок, AV блокада II-III ст., SA блокада, СССУ, брадикардия (ЧСС менее 60 уд/мин - при лечении ХСН, менее 50/мин - по др. показаниям), кардиомегалия (без признаков СН), артериальная гипотензия (систолическое АД менее 100 мм.рт.ст. - при лечении ХСН и 90 мм рт.ст. - по др. показаниям), ХОБЛ (в т.ч. бронхиальная астма), нарушение периферического кровообращения (поздние стадии); период лактации, одновременный прием ингибиторов МАО (за исключением ингибиторов МАО-В). С осторожностью Феохромоцитома, псориаз, сахарный диабет (может маскировать симптомы гипогликемии), метаболический ацидоз, тяжелые аллергические реакции (в анамнезе), стенокардия Принцметала, AV-блокада I ст., депрессия (в т.ч. в анамнезе), почечная/печеночная недостаточность, беременность, детский возраст (эффективность и безопасность не определены).
	Бендазол	Раствор для инъекций 1%(ампулы)2 мл и 5 мл № 10,	ФК	Гиперчувствительность. С осторожностью Пожилой возраст (снижение сердечного выброса).
	Дигоксин	Таблетки 0,00025 №	ГГ	Гиперчувствительность, гликозидная интоксикация, синдром WPW, AV блокада II ст., перемежающаяся полная

		раствор для инъекций (ампулы) 0,025% 1мл № 10		блокада. С осторожностью AV блокада I ст., СССУ без водителя ритма, вероятность нестабильного проведения по AV узлу, приступы Морганьи-Адамса-Стокса в анамнезе, ГОКМП, изолированный митральный стеноз с редкой ЧСС, сердечная астма при митральном стенозе (при отсутствии тахисистолической формы мерцательной аритмии), острый инфаркт миокарда, нестабильная стенокардия, артериовенозный шунт, гипоксия, сердечная недостаточность с нарушением диастолической функции (рестриктивная кардиомиопатия, амилоидоз сердца, констриктивный перикардит, тампонада сердца), экстрасистолия, выраженная дилатация полостей сердца, "легочное" сердце, электролитные нарушения (гипокалиемия, гипомагниемия, гиперкальциемия, гипернатриемия), гипотиреоз, алкалоз, миокардит, пожилой возраст, почечная/печеночная недостаточность, ожирение.
	Карведилол	Табл.0,025 и 0,125№	ГГ	Гиперчувствительность, острая и декомпенсированная ХСН, требующая в/в введения инотропных ЛС, AV блокада II-III ст.(без искусственного водителя ритма), выраженная брадикардия, СССУ, кардиогенный шок, тяжелая печеночная недостаточность, бронхиальная астма или бронхоспазм (в анамнезе), выраженная артериальная гипотензия (систолическое АД меньше 85 мм рт.ст.), период лактации, возраст до 18 лет (безопасность и эффективность применения не установлены). С осторожностью ХОБЛ, стенокардия Принцметала, AV блокада I ст., сахарный диабет, гипогликемия, тиреотоксикоз, окклюзионные заболевания периферических сосудов, феохромоцитома, депрессия, миастения, псориаз, обширные хирургические вмешательства, общая анестезия, сахарный диабет, почечная недостаточность, беременность.
	Моксонидин	Таблетки п/о 0,2 № 14 и 0,4 № 14	ГГ	ПротивопоказанияГиперчувствительность, СССУ, SA и AV блокада, брадикардия (менее 50/мин), декомпенсированная ХСН, нестабильная стенокардия, тяжелая печеночная недостаточность, ХПН (КК менее 30 мл/мин, креатинин более 160 мкмоль/л), период лактации. С осторожностьюБолезнь Паркинсона (тяжелая форма), эпилепсия, глаукома, депрессия, "перемежающаяся" хромота, болезнь Рейно; беременность, детский возраст - отсутствует опыт применения.
	Кандесартан	Таблетки 0,008 № 28	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации, первичный гиперальдостеронизм (резистентность к терапии). С осторожностью Почечная недостаточность, двусторонний стеноз почечных артерий, стеноз почечной артерии единственной почки, гиперкалиемия, стеноз аортального и митрального клапана, ГОКМП, снижение ОЦК, детский возраст.
	Допамин	Раствор для инъекций 4% (ампулы) 5 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, ГОКМП, феохромоцитома, фибрилляция желудочков. С осторожностью Гиповолемия, инфаркт миокарда, нарушения ритма сердца (тахиаритмии, желудочковые аритмии, фибрилляция предсердий), метаболический ацидоз, гиперкапния, гипоксия, гипертензия в "малом" круге кровообращения, тиреотоксикоз, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы, оккюзионные заболевания сосудов (в т.ч. атеросклероз, тромбоэмболия, облитерирующий тромбангиит, облитерирующий эндартериит, диабетический эндартериит, болезнь Рейно, отморожение), сахарный диабет, бронхиальная астма (если в анамнезе отмечалась гиперчувствительность к дисульфиту), беременность, период лактации, возраст до 18 лет

	Фенилэфрин	Раствор для инъекций 1%(ампулы)2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, ГОКМП, феохромоцитома, фибрилляция желудочков. С осторожностью Метаболический ацидоз, гиперкапния, гипоксия, фибрилляция предсердий, закрытоугольная глаукома, артериальная гипертензия, гипертензия в малом круге кровообращения, гиповолемия, тяжелый стеноз устья аорты, острый инфаркт миокарда, тахиаритмия, желудочковая аритмия; окклюзионные заболевания сосудов (в т.ч. в анамнезе) - артериальная тромбоэмболия, атеросклероз, облитерирующий тромбангиит (болезнь Бюргера), болезнь Рейно, склонность сосудов к спазмам (в т.ч. при отморожении), диабетический эндартериит, тиреотоксикоз, беременность, период лактации, пожилой возраст, возраст до 18 лет.
	Эпинефрин	Раствор для инъекций 0,1% (ампулы) 1мл № 5	ГГ	Гиперчувствительность, ГОКМП, феохромоцитома, артериальная гипертензия, тахиаритмия, ИБС, фибрилляция желудочков, беременность, период лактации. С осторожностью Метаболический ацидоз, гиперкапния, гипоксия, фибрилляция предсердий, желудочковая аритмия, легочная гипертензия, гиповолемия, инфаркт миокарда, шок неаллергического генеза (в т.ч. кардиогенный, травматический, геморрагический), тиреотоксикоз, окклюзионные заболевания сосудов (в т.ч. в анамнезе - артериальная эмболия, атеросклероз, болезнь Бюргера, холодовая травма, диабетический эндартериит, болезнь Рейно), церебральный атеросклероз, закрытоугольная глаукома, сахарный диабет, болезнь Паркинсона, судорожный синдром, гипертрофия предстательной железы; одновременное применение ингаляционных анестетиков (галотана, циклопропана, хлороформа), пожилой возраст, детский возраст.
11.	Диагностические средства			
11.1.	Рентгеноконтрастные средства			
	Бария сульфат	Порошок	ГГ	Гиперчувствительность; перфорация стенок ЖКТ (подозрение на нее), эзофаготрахеальные свищи; нарушение глотания, кишечная непроходимость, запоры, стеноз пищевода, кровотечение из органов ЖКТ, беременность; состояние после оперативных вмешательств на органах ЖКТ; синдром мальабсорбции, пищевая аллергия. С осторожностью Общее тяжелое состояние больного.
	Натрия амидотризоат	Раствор для инъекций 76% (ампулы) 10мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к йодсодержащим рентгеноконтрастным ЛС), печеночная недостаточность, выраженный атеросклероз сосудов головного мозга, острая коронарная недостаточность, декомпенсированная ХСН, выраженная артериальная гипертензия, шок, коллапс, гиперкоагуляция, ХПН, тиреотоксикоз, узловой зоб, плазмоцитома, активный туберкулез; для восходящей пиелографии - острая уроинфекция; для флебографии - острый флебит. С осторожностью Беременность, декомпенсированный сахарный диабет, общее тяжелое состояние.
12.	Антисептики и средства для дезинфекции			
12.1.	Антисептики			

	Аммиак	Раствор (флаконы) 10 % 40 мл и 50 мл	ГГ	Гиперчувствительность; при наружном применении - нарушение целостности кожных покровов, воспалительные заболевания кожи (в т.ч. дерматит, экзема) и др. заболевания кожи в месте предполагаемого нанесения. С осторожностью Беременность, период лактации, детский возраст
	Бриллиантовый зеленый	Р-р спиртовый 1 % (флаконы) 10 мл и	ГГ	Гиперчувствительность.
	Йод	Р-р спиртовый 5 % (флаконы) 25 мл и 40 мл	ГГ	Гиперчувствительность. Для приема внутрь - туберкулез легких, нефрит, нефроз, фурункулез, угревая сыпь, пиодермия, геморрагический диатез, крапивница, тиреотоксикоз, аденома щитовидной железы, ХПН, диабетические изъязвления кожи, беременность, детский возраст (до 5 лет).
	Калия перманганат	Порошок 3 г	ГГ	Гиперчувствительность.
	Этанол	Р-р 70 % и 95% (флаконы) 100 г	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Беременность, период лактации, детский возраст.
	Хлоргексидин	Р-р 0,05 % (флаконы) 100 мл	ГГ	Гиперчувствительность, дерматиты. С осторожностью Детский возраст, беременность, период лактации.
12.2.	Средства для дезинфекции			
	Биодез-экстра	Жидкость	ГГ	Противопоказания: гиперчувствительность
	Лижен	Жидкость	ГГ	Противопоказания: гиперчувствительность
	Санивап	Табл. №300	ФК	Противопоказания: гиперчувствительность
	Лизоформин -3000	Жидкость 1 литр	ФК	Противопоказания: гиперчувствительность
	Ника-экстра М	Табл. № 320	ФК	Противопоказания: гиперчувствительность
	Жавель Солид	Табл. № 320	ФК	Противопоказания: гиперчувствительность
	Аламинол	Жидкость 1 литр	ФК	Противопоказания: гиперчувствительность
	Гирея-Дез	Жидкость 1 литр	ФК	Противопоказания: гиперчувствительность
13.	Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта			

13.1.	Средства, используемые для лечения заболеваний, сопровождающихся эрозивно-язвенными процессами в пищеводе, желудке и двенадцатиперстной кишке			
	Алгедрат+ магния оксид	Суспензия Суспензия 15мл № 30	ФК	Гиперчувствительность, ХПН, беременность, болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия. С осторожностью Детский возраст (до 12 лет), период лактации.
	Висмута трикалия дицитрат	Таблетки 0,12 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, ХПН, беременность, период лактации.
	Домперидон	Таблетки 0,01 №20	ГГ	Гиперчувствительность, кровотечения из ЖКТ, механическая кишечная непроходимость, перфорация желудка или кишечника, пролактинома, детский возраст (до 5 лет и детям с массой тела до 20 кг) - для таблеток. С осторожностью Почечная/печеночная недостаточность, период лактации, беременность.
	Фамотидин	Таблетки п/о 0,04 № 30, раствор для инъекций (ампулы)0,5% 2 мл№ 10	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Печеночная и/или почечная недостаточность, цирроз печени с портосистемной энцефалопатией (в анамнезе), иммунодефицит, детский возраст, беременность, период лактации.
	Ранитидин	Таблетки 0,15 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, период лактации. С осторожностью Почечная и/или печеночная недостаточность, цирроз печени с энцефалопатией (в анамнезе), острая порфирия (в т.ч. в анамнезе), угнетение иммунитета, детский возраст (до 12 лет), беременность.
	Омепразол	Капсулы 0,02 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, детский возраст, период лактации. С осторожностью Беременность.
	Лансопразол	Капсулы 0,03 № 30	ФК	Гиперчувствительность, беременность (I триместр), период лактации. С осторожностью Печеночная недостаточность, беременность (II-III триместры), пожилой возраст, возраст до 18 лет.
	Пантопразол	Таблетки 0,02 № 28	ГГ	Гиперчувствительность, диспепсия невротического генеза. С осторожностью Беременность, период лактации; печеночная недостаточность.
	Сукральфат	Таблетки 0,5 № 100	ГГ	Гиперчувствительность, детский возраст до 4 лет (для таблеток). С осторожностью ХПН, беременность, период лактации.
	Метоклопрамид	раствор для инъекций (ампулы)0,01/ 2,0 №10, табл. 0,01 № 50	ГГ	Гиперчувствительность, кровотечение желудочно-кишечное, стеноз привратника желудка, механическая кишечная непроходимость, перфорация желудка или кишечника, феохромоцитома, экстрапирамидные нарушения, эпилепсия, пролактинозависимые опухоли, беременность, период лактации. С осторожностью Бронхиальная астма, артериальная гипертензия, болезнь Паркинсона, печеночная и/или почечная недостаточность, пожилой возраст, ранний детский возраст (повышенный риск возникновения дискинетического синдрома).

	Алюминия гидроксид+натрия гидроксид+сорбитол	Флаконы сусп. 170мл	ФК	Гиперчувствительность, ХПН, беременность, болезнь Альцгеймера, гипофосфатемия. С осторожностью Детский возраст (до 12 лет), период лактации.
	Висмута нитрат основной	Таблетки № 10	ФК	Гиперчувствительность, гипоацидный гастрит. Почечная недостаточность.
13.2.	Спазмолитические средства			
	Дротаветин	Табл.0,04 № 20, раствор для инъекций (ампулы)2% 2 мл № 10, № 25	ГГ	Гиперчувствительность, выраженная печеночная и почечная недостаточность, тяжелая ХСН, период лактации; детский возраст до 18 лет (для дозировки 80 мг). С осторожностью Артериальная гипотензия, беременность
	Мебеверин	Таблетки 0,2 № 30	ГГ	Противопоказания Гиперчувствительность. С осторожностью Беременность, период лактации.

	Платифиллин	Раствор для инъекций0,1% (ампулы) 1мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации. С осторожностью Заболевания ССС, при которых увеличение ЧСС может быть нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, ХСН, ИБС, митральный стеноз, артериальная гипертензия, острое кровотечение;гипертиреоз (возможно усиление тахикардии);повышенная температура тела (может повыситься еще больше вследствие подавления активности потовых желез);рефлюкс-эзофагит, грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающаяся с рефлюкс-эзофагитом (снижение моторики пищевода и желудка и расслабление нижнего пищеводного сфинктера могут способствовать замедлению опорожнения желудка и усилению гастроэзофагеального рефлюкса через сфинктер с нарушенной функцией);заболевания ЖКТ, сопровождающиеся непроходимостью: ахалазия и стеноз привратника (возможно снижение моторики и тонуса, приводящее к непроходимости и задержке содержимого желудка);атония кишечника у больных пожилого возраста или ослабленных больных (возможно развитие непроходимости), паралитическая кишечная непроходимость;заболевания с повышенным внутриглазным давлением: закрытоугольная (мидриатический эффект, приводящий к повышению внутриглазного давления, может вызывать острый приступ) и открытоугольная глаукома (мидриатический эффект может вызывать некоторое повышение внутриглазного давления; может потребоваться коррекция терапии), возраст старше 40 лет (опасность проявления недиагностированной глаукомы);язвенный колит (высокие дозы могут угнетать перистальтику кишечника, повышая вероятность паралитической непроходимости кишечника; кроме того, возможно проявление или обострение такого тяжелого осложнения, как токсический мегаколон);сухость слизистой оболочки полости рта (длительное применение может вызывать дальнейшее усиление выраженности ксеростомии);печеночная недостаточность (снижение метаболизма) и почечная недостаточность (риск развития побочных эффектов вследствие снижения выведения платифиллина);хронические заболевания легких, особенно у детей младшего возраста и ослабленных больных (уменьшение бронхиальной секреции может приводить к сгущению секрета и образованию пробок в бронхах);миастения (состояние может ухудшаться из-за предотвращения действия ацетилхолина);вегетативная (автономная) нейропатия (задержка мочи и паралич аккомодации могут усиливаться), гиперплазия предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, задержка мочи или предрасположенность к ней или заболевания, сопровождающиеся обструкцией мочевыводящих путей (в т.ч. шейки мочевого пузыря вследствие гиперплазии предстательной железы);гестоз (возможно усиление артериальной гипертензии);повреждения мозга у детей (эффекты со стороны ЦНС могут усиливаться);болезнь Дауна (возможно необычное расширение зрачков и повышение ЧСС);центральный паралич у детей (реакция на холиноблокаторы может быть наиболее выражена).
13.3.	Панкреатические энзимы			
	Панкреатин	Табл.п/о 25 ЕД № 60, № 30, № 80	ГГ	Гиперчувствительность, острый панкреатит, обострение хронического панкреатита.
13.4.	Антидиарейные средства			
	Лоперамид	Таблетки 0,002 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, острый язвенный колит, дивертикулез, диарея на фоне

				псевдомембранозного колита, дизентерии и др. инфекций ЖКТ; беременность (I триместр), период лактации, детский возраст (до 2 лет, для капсул 6 лет). С осторожностью Печеночная недостаточность.
	Смектит диэктаэдрический	Порошок 3,0 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, кишечная непроходимость.
	Уголь активированный	Таблетки 0,25 № 10	ФК	Гиперчувствительность, язвенные поражения ЖКТ (в т.ч. язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит), кровотечения из ЖКТ
13.5.	Слабительные средства			
	Лактулоза	Раствор (флаконы) 200 мл и 500мл,	ГГ	Гиперчувствительность, ректальные кровотечения недиагностированные, коло-, илеостома, подозрение на аппендицит, галактоземия, непроходимость кишечника. С осторожностью Сахарный диабет.
	Макрогол	Порошок 64г № 4	ГГ	Гиперчувствительность, дегидратация, ХСН, эрозивно-язвенные поражения слизистой оболочки толстого кишечника (в т.ч. язвенный ректоколит, болезнь Крона); кишечная непроходимость (в т.ч. спастическая, обтурационная); боль в животе неясной этиологии, детский возраст. С осторожностью Беременность, период лактации
	Бисакодил	Таблетки п/о 0,005 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, кровотечения из ЖКТ, метроррагия, цистит, спастические запоры, острый проктит, острый геморрой, рак толстой кишки (для суппозиториев), грудной возраст. С осторожностью Беременность, период лактации, печеночная и/или почечная недостаточность
	Натрия пикосульфат	Раствор (флаконы) 15 мл и 30мл	ФК	Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, ущемленная грыжа, острые воспалительные заболевания органов брюшной полости, перитонит, боль в животе (неясного генеза), тяжелая дегидратация, кровотечения из ЖКТ, метроррагия, цистит, спастический запор, детский возраст (до 4 лет), беременность (I триместр). С осторожностью Период лактации.
13.6.	Средства, используемые для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей			
	Адеметионин	Лиофилизированный пор. 0,4 (флаконы) (с р-ом 5мл) № 5, таблетки п/о 0,4 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, беременность (I-II триместр), период лактации. С осторожностью Детский возраст.
	Урсодезоксихолевая	Капсулы 0,25 №	ГГ	Гиперчувствительность, рентгенположительные (с высоким содержанием Ca2+) желчные камни,

	кислота			нефункционирующий желчный пузырь, острые воспалительные заболевания желчного пузыря, желчных протоков и кишечника, цирроз печени в стадии декомпенсации, выраженная печеночная и/или почечная недостаточность, панкреатит, беременность, период лактации, детский возраст (до 3 лет - для капсул).
	Орнитин	Концентрат для приготовления р-ра для инъекций 5,0-10мл Гранулы для приготовления р-ра для приема внутрь 5,-10мл	ГГ	Противопоказания Гиперчувствительность, почечная недостаточность (креатинин более 3 мг/100 мл), период лактации. С осторожностью Беременность.
	Артишока листьев экстракт	Таблетки п/о 0,2 № 60 Раствор 20% 120мл для приема внутрь Раствор для инъекций амп. 5мл № 5	ФК	Противопоказания Гиперчувствительность, калькулезный холецистит, непроходимость желчевыводящих путей, острые заболевания печени, почек, желче- и мочевыводящих путей, детский возраст (до 6 лет). С осторожностью Беременность, период лактации.
	Фосфолипиды+глициризиновая кислота	Капс.форте № 50, раствор для инъекций (ампулы) 5 мл № 5	ГГ	Гиперчувствительность.
13.7.	Антиферменты			
	Апротинин	Флаконы 10000 ЕД	ГГ	Гиперчувствительность, резко выраженные аллергические реакции (в т.ч. на белок крупного рогатого скота), ДВС-синдром (за исключением фазы коагулопатии); беременность (I и III триместры), период лактации. С осторожностью Кардиопульмональные операции by-pass, глубокая гипотермия, остановка кровообращения (риск развития почечной недостаточности и летального исхода), аллергический диатез (в анамнезе), предшествующее лечение апротинином.
13.8	Прочие			
	Симетикон	Капсулы 40 мг № 25	ФК	Гиперчувствительность, кишечная непроходимость, обструктивные заболевания ЖКТ.
14.	Гормоны и средства, влияющие на эндокринную систему			
14.1.	Неполовые гормоны,синтетические субстанции и антигормоны			

	Гидрокортизон	Раствор для инъекций (флаконы) 0,125/ 5мл	ГГ	Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность.Для внутрисуставного введения: предшествующая артропластика, патологическая кровоточивость (эндогенная или вызванная применением антикоагулянтов), внутрисуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание, выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления в суставе (т.н. "сухой" сустав, например, при остеоартрозе без синовита), выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз формирующих сустав эпифизов костей.**С осторожностью**Паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической терапии.Поствакцинальный период (период длительностью 8 нед до и 2 нед после вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ. Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или ВИЧ-инфицирование).Заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, язвенный колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит.Заболевания ССС, в т.ч. недавно перенесенный инфаркт миокарда (у больных с острым и подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и вследствие этого - разрыв сердечной мышцы), декомпенсированная ХСН, артериальная гипертензия, гиперлипидемия.Эндокринные заболевания - сахарный диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга.Тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз.Гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению.Системный остеопороз, миастения gravis, острый психоз, ожирение (III-IV ст.), полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома, беременность, период лактации.Для внутрисуставного введения: общее тяжелое состояние пациента, неэффективность (или кратковременность) действия 2 предыдущих введений (с учетом индивидуальных свойств применявшихся ГКС).
	Дексаметазон	Раствор для инъекций (ампулы) 0,004/мл № 25	ГГ	Гиперчувствительность, системные микозы, др. системные инфекции при отсутствии адекватной противомикробной терапии, одновременное применение с живыми противовирусными вакцинами.Для местного применения (дополнительно) - введение в нестабильные суставы, септический артрит.Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность. С осторожностью Системные инфекции (на фоне адекватной противомикробной терапии), латентный туберкулез, герпес глаз (риск перфорации роговицы), сахарный диабет, ХСН, недавно перенесенный инфаркт миокарда, ХПН, дивертикулит, артериальная гипертензия, кератит, эпилепсия, язвенный колит (при угрозе перфорации или инфекционных осложнений), недавно установленный кишечный анастомоз, пептическая язва (в т.ч. в анамнезе), остеопороз, миастения gravis, пожилой возраст (повышенный риск развития остеопороза и артериальной гипертензии), гипотиреоз, печеночная недостаточность, «стероидная» миопатия, тяжелые аффективные расстройства (в т.ч. в анамнезе, особенно «стероидный» психоз), беременность, период лактации, детский возраст

	Преднизолон	Раствор для инъекций (ампулы) 0,03/1 мл № 3, таблетки 0,005 № 100	ГГ	Для кратковременного применения по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность.Для внутрисуставного введения: предшествующая артропластика, патологическая кровоточивость (эндогенная или вызванная применением антикоагулянтов), чрессуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание, выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления в суставе (так называемый "сухой" сустав, например, при остеоартрозе без синовита), выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз формирующих сустав эпифизов костей. С осторожностью Паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным): простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической терапии.Поствакцинальный период (период длительностью 8 нед до и 2 нед после вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ. Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или ВИЧ-инфицирование).Заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, язвенный колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит.Заболевания ССС, в т.ч. недавно перенесенный инфаркт миокарда (у больных с острым и подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и вследствие этого - разрыв сердечной мышцы), декомпенсированная ХСН, артериальная гипертензия, гиперлипидемия.Эндокринные заболевания: сахарный диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга.Тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз.Гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению.Системный остеопороз, миастения gravis, острый психоз, ожирение (III-IV ст.), полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома, беременность, период лактации.Для внутрисуставного введения: общее тяжелое состояние пациента, неэффективность (или кратковременность) действия 2 предыдущих введений (с учетом индивидуальных свойств применявшихся ГКС).

	Триамцинолон	Таблетки 0,004 № 50	ГГ	Для кратковременного применения по жизненным показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность.Для внутрисуставного введения: предшествующая артропластика, патологическая кровоточивость (эндогенная или вызванная применением антикоагулянтов), чрессуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание, выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления в суставе (т.н. "сухой" сустав, например, при остеоартрозе без синовита), выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз формирующих сустав эпифизов костей.С осторожностью Паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); темный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической терапии.Поствакцинальный период (период длительностью 8 нед до и 2 нед после вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ. Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или ВИЧ-инфицирование).Заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, язвенный колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит.Заболевания ССС, в т.ч. недавно перенесенный инфаркт миокарда (у больных с острым и подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и вследствие этого - разрыв сердечной мышцы), декомпенсированная ХСН, артериальная гипертензия, гиперлипидемия).Эндокринные заболевания - сахарный диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга.Тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз.Гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению.Системный остеопороз, миастения gravis, острый психоз, ожирение (III-IV ст.), полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома, беременность, период лактации.Для внутрисуставного введения: общее тяжелое состояние пациента, неэффективность (или кратковременность) действия 2 предыдущих введений (с учетом индивидуальных свойств применявшихся ГКС).
	Левотироксин натрия	Таблетки 0,00001 № 100 и 0,000005 № 50	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностьюНедостаточность коры надпочечников (должна быть компенсирована до начала терапии), заболевания ССС (в т.ч. ИБС, стенокардия, атеросклероз, артериальная гипертензия, инфаркт миокарда в анамнезе), сахарный и несахарный диабет, тиреотоксикоз в анамнезе, синдром мальабсорбции (может потребоваться коррекция дозы), гипофизарная недостаточность, тяжелая длительно существующая гипофункция щитовидной железы.

	Бетаметазон	Раствор для инъекций (ампулы)1 мл № 1	ГГ	Для парентерального введения при кратковременном применении по "жизненным" показаниям единственным противопоказанием является гиперчувствительность.Для внутрисуставного введения: предшествующая артропластика, патологическая кровоточивость (эндогенная или вызванная применением антикоагулянтов), внутрисуставной перелом кости, инфекционный (септический) воспалительный процесс в суставе и периартикулярные инфекции (в т.ч. в анамнезе), а также общее инфекционное заболевание, выраженный околосуставной остеопороз, отсутствие признаков воспаления в суставе (т.н. "сухой" сустав, например, при остеоартрозе без синовита), выраженная костная деструкция и деформация сустава (резкое сужение суставной щели, анкилоз), нестабильность сустава как исход артрита, асептический некроз формирующих сустав эпифизов костей. С осторожностью Паразитарные и инфекционные заболевания вирусной, грибковой или бактериальной природы (в настоящее время или недавно перенесенные, включая недавний контакт с больным) - простой герпес, опоясывающий герпес (виремическая фаза), ветряная оспа, корь; амебиаз, стронгилоидоз (установленный или подозреваемый); системный микоз; активный и латентный туберкулез. Применение при тяжелых инфекционных заболеваниях допустимо только на фоне специфической терапии.Поствакцинальный период (период длительностью 8 нед до и 2 нед после вакцинации), лимфаденит после прививки БЦЖ. Иммунодефицитные состояния (в т.ч. СПИД или ВИЧ-инфицирование).Заболевания ЖКТ: язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, эзофагит, гастрит, острая или латентная пептическая язва, недавно созданный анастомоз кишечника, язвенный колит с угрозой перфорации или абсцедирования, дивертикулит.Заболевания ССС, в т.ч. недавно перенесенный инфаркт миокарда (у больных с острым и подострым инфарктом миокарда возможно распространение очага некроза, замедление формирования рубцовой ткани и вследствие этого разрыв сердечной мышцы), декомпенсированная ХСН, артериальная гипертензия, гиперлипидемия).Эндокринные заболевания - сахарный диабет (в т.ч. нарушение толерантности к углеводам), тиреотоксикоз, гипотиреоз, болезнь Иценко-Кушинга.Тяжелая хроническая почечная и/или печеночная недостаточность, нефроуролитиаз.Гипоальбуминемия и состояния, предрасполагающие к ее возникновению.Системный остеопороз, миастения gravis, острый психоз, ожирение (III-IV ст.), полиомиелит (за исключением формы бульбарного энцефалита), открыто- и закрытоугольная глаукома, беременность, период лактации.Для внутрисуставного введения: общее тяжелое состояние пациента, неэффективность (или кратковременность) действия 2 предыдущих введений (с учетом индивидуальных свойств применявшихся ГКС).
14.2.	Андрогены			
	Тестостерон (смесь эфиров)	Раствор для инъекций (ампулы)1мл № 3	ГГ	Гиперчувствительность, рак предстательной железы и/или грудной железы, гинекомастия, нефроз или нефротическая стадия нефрита, гипертрофия предстательной железы с задержкой мочи, печеночная/почечная недостаточность, гиперкальциемия, отеки, ХСН, сахарный диабет, инфаркт миокарда в анамнезе, распространенный атеросклероз, беременность, период лактации. С осторожностьюАстеническое телосложение, пожилой возраст у мужчин; подростковый возраст у мальчиков (перед периодом полового созревания).
14.5.	Инсулин и средства для лечения сахарного диабета			
	Инсулин (человеческий	Фл.100ЕД/мл10мл,	ГГ	Гиперчувствительность, гипогликемия.

	генноинженерный)	пенфилл 100ЕД 3мл № 5		
	Инсулин- изофан (человеческий генноинженерный)	Фл.100ЕД/мл10мл, пенфилл 100ЕД 3мл № 5	ГГ	Гиперчувствительность, гипогликемия.
	Глибенкламид	Таблетки 0,005 № 120 ,0,0025 № 40	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным сульфонилмочевины, сульфаниламидам, диуретикам, содержащим сульфонамидную группу, пробенециду), сахарный диабет типа 1, диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, состояния после резекции поджелудочной железы, декомпенсация углеводного обмена при инфекционных заболеваниях или после больших хирургических операций, когда показано проведение инсулинотерапии, кишечная непроходимость, парез желудка, состояния, сопровождающиеся нарушением всасывания пищи и развитием гипогликемии, лейкопения, беременность, период лактации. С осторожностью Алкоголизм, надпочечниковая недостаточность, гипофункция передней доли гипофиза, заболевания щитовидной железы (с нарушением функции), лихорадочный синдром, пожилой возраст.
	Гликвидон	Таблетки 0,03 № 30	ГГ	Гиперчувствительность, сахарный диабет типа 1, диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома, состояния после резекции поджелудочной железы, острая печеночная порфирия, тяжелая печеночная недостаточность, острые состояния (в т.ч. острые инфекционные заболевания и обширные хирургические вмешательства), беременность, период лактации, детский и юношеский возраст. С осторожностью Алкоголизм, лихорадочный синдром, заболевания щитовидной железы (гипотиреоз или тиреотоксикоз).
	Гликлазид	Таблетки 0,03 и 0,08	ГГ	Гиперчувствительность, сахарный диабет типа 1, диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома, тяжелая печеночная и/или почечная недостаточность, сопутствующая терапия миконазолом, беременность, период лактации, возраст до 18 лет.Для ЛФ, содержащих лактозу (дополнительно): врожденная непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозная мальабсорбция. С осторожностью Пожилой возраст, нерегулярное и/или несбалансированное питание, тяжелые заболевания ССС (в т.ч. ИБС, атеросклероз), гипотиреоз, надпочечниковая или гипофизарная недостаточность, гипопитуитаризм, почечная и/или печеночная недостаточность, длительная терапия ГКС, алкоголизм, недостаточность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, сопутствующая терапия фенилбутазоном и даназолом.
	Глимепирид	Таблетки 0,002 № 30	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. сульфаниламидам), сахарный диабет типа 1, диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома, гиперосмолярная кома, тяжеллая печеночная и почечная недостаточность (в т.ч. пациенты, находящиеся на гемодиализе), беременность, период лактации. С осторожностью Состояния, требующие перевода на инсулинотерапию (обширные ожоги, тяжелая множественная травма, обширные хирургические вмешательства, нарушения всасывания пищи и ЛС в ЖКТ (в т.ч. кишечная непроходимость, парез желудка).

	Метформин	Таблетки 0,5 № 60	ГГ	Гиперчувствительность, гипергликемическая кома, кетоацидоз, ХПН, заболевания печени, ХСН, острый инфаркт миокарда, нарушение дыхания, дегидратация, алкоголизм, гипокалорийная диета (менее 1000 ккал/сут), лактат-ацидоз (в т.ч. в анамнезе), беременность, период лактации. Препарат не назначается за 2 сут перед хирургическими операциями, радиоизотопными, рентгенологическими исследованиями с введением йодсодержащего контрастного ЛС и в течение 2 дней после их проведения. С осторожностью Возраст старше 60 лет, выполнение тяжелой физической работы (повышенная опасность развития у них лактат-ацидоза).
	Тиоктовая (альфа-липоевая) кислота	Раствор для инъекций (ампулы)0,3/12 мл и 0,6/24мл № 5, табл.п/о 0,3 № 30,	ГГ	Гиперчувствительность, детский возраст (эффективность и безопасность применения не установлены). С осторожностьюБеременность, период лактации.
15.	Средства используемые в урологии			
15.3.	Диуретики			
	Ацетазоламид	Табл.0,25 № 24	ГГ	Гиперчувствительность, острая почечная недостаточность, печеночная недостаточность, гипокалиемия, ацидоз, гипокортицизм, болезнь Аддисона, уремия, сахарный диабет, беременность (I триместр). С осторожностью Отеки печеночного и почечного генеза.
	Гидрохлортиазид	Табл.0,025 № 20, табл.0,1 № 20	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. сульфонамидам), сахарный диабет (трудно контролируемый), ХПН (КК менее 30 мл/мин), анурия, тяжелая печеночная недостаточность, болезнь Аддисона, рефрактерная гипокалиемия, гиперкальциемия и гипонатриемия; беременность (I триместр), период лактации, детский возраст (до 3 лет).Для ЛФ, содержащих лактозу (дополнительно): пациенты с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость лактозы, дефицит лактазы или глюкозо-галактозной мальабсорбцией. С осторожностьюГипокалиемия, гиперкальциемия, гипонатриемия, ИБС, одновременный прием сердечных гликозидов, подагра, легкая и умеренная печеночная недостаточность, прогрессирующие заболевания печени (риск развития печеночной комы), цирроз печени (риск развития гипомагниемии), пожилой возраст, беременность (II-III триместр).
	Маннитол	Флаконы 200мл и	ГГ	Гиперчувствительность, анурия на фоне острого некроза канальцев почек, тяжелая дегидратация, недостаточность ЛЖ (особенно сопровождающаяся отеком легких), ХСН, геморрагический инсульт, субарахноидальное кровоизлияние (кроме кровотечений во время трепанации черепа), гипонатриемия, гипохлоремия, гипокалиемия. С осторожностью Беременность, период лактации, пожилой возраст.

	Спиронолактон	Таблетки 0,025 № 20, капсулы 0,05 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, болезнь Аддисона, гиперкалиемия, гипонатриемия, тяжелая ХПН (КК менее 10 мл/мин), анурия, беременность, период лактации. С осторожностью AV блокада (возможность усиления в связи с развитием гиперкалиемии), декомпенсированный цирроз печени, сахарный диабет (при подтвержденной или предполагаемой ХПН), диабетическая нефропатия, дисменорея, увеличение молочных желез, печеночная недостаточность, хирургические вмешательства, прием ЛС, вызывающих гинекомастию, местных и общих анестетиков, пожилой возраст.
	Торасемид	Таблетки 0,005 № 20, № 60 таблетки 0,01 № 20, № 30, № 60	ФК	Гиперчувствительность (в т.ч. к сульфонамидам), анурия, печеночная кома и прекома, ХПН с нарастающей азотемией, артериальная гипотензия, аритмия, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Предрасположенность к гиперурикемии, подагре, сахарный диабет (в т.ч. латентный).
	Фуросемид	Таблетки 0,04 № 50, Раствор для инъекций 1%(ампулы) 2 мл № 10,	ГГ	Гиперчувствительность, острая почечная недостаточность с анурией (величина клубочковой фильтрации менее 3-5 мл/мин), тяжелая печеночная недостаточность, печеночная кома и прекома, стеноз мочеиспускательного канала, острый гломерулонефрит, обструкция мочевыводящих путей камнем, прекоматозные состояния, гипергликемическая кома, гиперурикемия, подагра, декомпенсированный митральный или аортальный стеноз, ГОКМП, повышение центрального венозного давления (свыше 10 мм рт.ст.), артериальная гипотензия, острый инфаркт миокарда, панкреатит, нарушение водно-электролитного обмена (гиповолемия, гипонатриемия, гипокалиемия, гипохлоремия, гипокальциемия, гипомагниемия), дигиталисная интоксикация. С осторожностью Гиперплазия предстательной железы, СКВ, гипопротеинемия (риск развития ототоксичности), сахарный диабет (снижение толерантности к глюкозе), стенозирующий атеросклероз церебральных артерий, беременность (особенно первая половина, возможно применение по жизненным показаниям), период лактации.
17.	Средства, влияющие на мускулатуру матки			
	Окситоцин	Ампулы 5 МЕ/ 1 мл № 5	ГГ	Гиперчувствительность; узкий таз (анатомический и клинический), поперечное и косое положение плода, лицевое предлежание плода, преждевременные роды, угрожающий разрыв матки, рубцы на матке (после перенесенного ранее кесарева сечения, операции на матке), чрезмерное растяжение матки, матка после многократных родов, частичное предлежание плаценты, маточный сепсис, инвазивная карцинома шейки матки; гипертонус матки (возникший не в ходе родов), сдавление плода, артериальная гипертензия, ХПН.
	Магния сульфат	Раствор для инъекций 25% (ампулы) 5 мл и	ГГ	Гиперчувствительность, аппендицит, ректальное кровотечение (в т.ч. предполагаемое), кишечная непроходимость, дегидратация, гипермагниемия. С осторожностью Блокада сердца, поражение миокарда, ХПН.
18.	Средства, влияющие на органы дыхания			
18.1.	Противоастматические средства			
	Сальбутамол	Аэрозоль 12мл,	ГГ	Гиперчувствительность, беременность (при использовании в качестве бронхолитика), период лактации, детский

		аэроз. 200доз, небулы р-р д/инг		возраст (младше 6 лет - для таблеток, младше 2 лет - для раствора для приема внутрь и сиропа).Для в/в введения в качестве токолитика (дополнительно) - инфекции родовых путей, внутриутробная гибель плода, пороки развития плода, кровотечение при предлежании плаценты или преждевременной отслойке плаценты; угрожающий выкидыш (в I-II триместре беременности). С осторожностью Тахиаритмия, тяжелая ХСН, артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, тахиаритмия, феохромоцитома, беременность, период лактации, ИБС (стенокардия, инфаркт миокарда), миокардит, пороки сердца, аортальный стеноз, сахарный диабет, эпилепсия, судороги, стеноз ЖКТ (в т.ч. пилородуоденальный).
	Аминофиллин	Раствор для инъекций 2,4 % (ампулы) 5 мл и 10 мл № 10,	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным ксантина: кофеин, пентоксифиллин, теобромин), эпилепсия, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения - для пероральных форм, особено таблеток непролонгированного действия), гастрит с повышенной кислотностью, тяжелая артериальная гипер- или гипотензия, тяжелые тахиаритмии, геморрагический инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, детский возраст (до 3 лет, для пролонгированных пероральных форм - до 12 лет). С осторожностью Тяжелая коронарная недостаточность (острая фаза инфаркта миокарда, стенокардия), распространенный атеросклероз сосудов, ГОКМП, частая желудочковая экстрасистолия, повышенная судорожная готовность, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в анамнезе), кровотечение из ЖКТ в недавнем анамнезе, неконтролируемый гипотиреоз (возможность кумуляции) или тиреотоксикоз, длительная гипертермия, гастроэзофагеальный рефлюкс, гипертрофия предстательной железы. беременность, период лактации, пожилой возраст, детский возраст (особенно для пероральных форм).
	Фенотерол	Аэрозоль 10мл 200доз	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью ИБС, неконтролируемая артериальная гипертензия, митральный порок (недостаточность и/или стеноз), миокардит, тахиаритмии, трепетание желудочков, ГОКМП, инфаркт миокарда (острая стадия), гипокалиемия, тиреотоксикоз, синдром WPW, глаукома
	Ипратропия бромид+фенотерол	Р-р.20мл р-р, аэроз.10мл 200доз	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к атропину и его соединениям), тахиаритмия, ГОКМП, беременность (I триместр), детский возраст (до 6 лет). С осторожностью Коронарная недостаточность, артериальная гипертензия, сахарный диабет (недостаточно контролируемый), недавно перенесенный инфаркт миокарда, тяжелые органические заболевания сердца и сосудов, гипертиреоз, феохромоцитома, гиперплазия предстательной железы, обструкция шейки мочевого пузыря, закрытоугольная глаукома, муковисцидоз, детский возраст.
	Беклометазон	Суспензия для ингаляций 800мкг/2мл	ФК	Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст до 6 лет, туберкулезная инфекция органов дыхания, беременность (1 триместр) и период лактации. С осторожностью: цирроз печени, глаукома,гипотиреоз, системные инфекции (бактериальные, грибковые, паразитарные), вирусные инфекции органов дыхания, остеопороз.
	Будесонид	Аэроз.100мкг 200доз, р-р для небул 0,25/мл 2мл № 20	ГГ	Гиперчувствительность; детский возраст до 3 мес (суспензия), до 6 лет (порошок), до 16 лет (раствор для ингаляций). С осторожностью Туберкулез, грибковые, бактериальные и вирусные инфекции органов дыхания, беременность, период лактации

	Будесонид + формотерол	Аэроз.160/4,5мкг/доза 60 доз, аэроз.320/9мкг/доза 60 доз	ГГ	Гиперчувствительность к будесониду, формотеролу или лактозе. Детский возраст (до 6 лет). С осторожностью Беременность, период лактации, туберкулез легких, грибковые, вирусные или бактериальные инфекции органов дыхания, тиреотоксикоз, феохромоцитома, сахарный диабет, неконтролируемая гипокалиемия, ГОКМП, тяжелая артериальная гипертензия, аневризма, ИБС, тахиаритмия, декомпенсированная ХСН, удлиненный интервал Q-T.
	Теофиллин	Таблетки 0,2 № 40,	ГГ	Гиперчувствительность (в т.ч. к др. производным ксантина - кофеину, пентоксифиллину, теобромину), эпилепсия, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в стадии обострения - для пероральных форм, особено таблеток непролонгированного действия), гастрит с повышенной кислотностью, кровотечение из ЖКТ, тяжелая артериальная гипер- или гипотензия, тяжелые тахиаритмии, геморрагический инсульт, кровоизлияние в сетчатку глаза, детский возраст (до 3 лет, для пролонгированных пероральных форм - до 12 лет). С осторожностью Тяжелая коронарная недостаточность (острая фаза инфаркта миокарда, стенокардия), распространенный атеросклероз сосудов, ГОКМП, частая желудочковая экстрасистолия, ХСН, повышенная судорожная готовность, печеночная и/или почечная недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в анамнезе), кровотечение из ЖКТ в недавнем анамнезе, неконтролируемый гипотиреоз (возможность кумуляции) или тиреотоксикоз, длительная гипертермия, гастроэзофагеальный рефлюкс, гипертрофия предстательной железы, беременность, период лактации, пожилой возраст, детский возраст (особенно для пероральных форм).
18.2.	Прочие средства для лечения заболеваний органов дыхания			
	Ацетилцистеин	Ампулы 0,3/ 2 мл № 5, табл. шип.0,6 № 10	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации. С осторожностью Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения), варикозное расширение вен пищевода, кровохарканье, легочное кровотечение, фенилкетонурия (для форм, содержащих аспартам), бронхиальная астма (при в/в введении риск развития бронхоспазма), заболевания надпочечников, печеночная и/или почечная недостаточность, артериальная гипотензия.
	Амброксол	Раствор таблетки 0,03 № 20	ГГ	Гиперчувствительность, беременность (I триместр), фенилкетонурия (для лекарственных форм, содержащих аспартам). С осторожностью Печеночная недостаточность, почеченая недостаточность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, беременность (II-III триместр), период лактации.
	Бромгексин хлорид	Табл.0,008 № 50	ФК	Гиперчувствительность, пептическая язва желудка, беременность (I триместр); период лактации; детский возраст (до 6 лет - для таблетированных форм). С осторожностью Почечная и/или печеночная недостаточность; заболевания бронхов, сопровождающиеся чрезмерным скоплением секрета, в анамнезе - желудочное кровотечение.
	Оксиметазолин	Спрей наз.0,2% 15 мл и 30мл, спрей наз.0,05% 10мл капли 0,05% 10мл,	ГГ	Гиперчувствительность, атрофический ринит, детский возраст (до 6 лет - для глазных капель). С осторожностью ХСН, аритмии, выраженный атеросклероз, артериальная гипертензия, тиреотоксикоз, сахарный диабет, ХПН, закрытоугольная глаукома, гиперплазия предстательной железы с клиническими симптомами, беременность, период лактации.

	Термопсис+натрия гидрокарбонат	Таблетки № 10	ФК	Гиперчувствительность, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки.
	Нафазолин	Раствор 0,1% (флаконы) 10мл	ФК	Гиперчувствительность; артериальная гипертензия, выраженный атеросклероз, тиреотоксикоз, детский возраст (до 1 года), хронический ринит, тяжелые заболевания глаз, сахарный диабет; одновременный прием ингибиторов МАО и период до 14 дней после окончания их применения. С осторожностью Беременность, период лактации.
19.	Растворы, электролиты,средства коррекции кислотного равновесия			
	Натрия хлорид	Раствор для инъекций 0,9% (ампулы) 5мл и 10мл №10, Раствор для инфузий 0,9%(флаконы) 200мл	ГГ	Гипернатриемия, ацидоз, гиперхлоремия, гипокалиемия, внеклеточная гипергидратация; циркуляторные нарушения, угрожающие отеком мозга и легких; отек мозга, отек легких, острая ЛЖ недостаточность, сопутствующее назначение ГКС в больших дозах. С осторожностью Декомпенсированная ХСН, ХПН (олиго-, анурия).
	Калия хлорид	Раствор для инъекций 4% (ампулы) 10 мл № 10	ГГ	Гиперкалиемия, полная AV блокада, надпочечниковая недостаточность, ХПН, сопутствующая терапия калийсберегающими диуретиками, метаболические нарушения (ацидоз, гиповолемия с гипонатриемией), эрозивно-язвенные заболевания ЖКТ, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены). С осторожностью Беременность, период лактации,
	Натрия хлорид+натрия ацетат	Раствор для инфузий (флаконы)200мл	ФК	Гиперчувствительность, почечная недостаточность, ХСН.
	Натрия хлорид+калия хлорид+натрия ацетат	Раствор для инфузий (флаконы)200мл	ФК	Гиперчувствительность, гиперкалиемия, алкалоз, ХПН, наличие противопоказаний к введению в организм больших количеств жидкости.
	Натрия хлорид+калия хлорид+натрия гидрокарбонат	Раствор для инфузий (флаконы)200мл	ФК	Гиперчувствительность, гиперкалиемия, почечная недостаточность, ХСН
	Калия хлорид+магния хлорид+натрия ацетат+натрия глюконат+натрия хлорид	Раствор для инфузий (флаконы)500мл	ГГ	Гиперчувствительность, гиперкалиемия, почечная недостаточность, ХСН

	Реамберин	Раствор для инфузий (флаконы)200мл и 400мл	ГГ	Гиперчувствительность, состояния после ЧМТ, сопровождающиеся отеком головного мозга, выраженная ХПН, беременность, период лактации.
20.	Витамины и минералы			
	Аскорбиновая кислота	Раствор для инъекций 5% (ампулы) 2 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность, при длительном применении в больших дозах (более 500 мг) - сахарный диабет, гипероксалурия, нефроуролитиаз, гемохроматоз, талассемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. С осторожностью Сахарный диабет, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, гемохроматоз, сидеробластная анемия, талассемия, гипероксалурия, почечнокаменная болезнь.
	Кальция хлорид	Раствор для инъекций 10% (ампулы) 10мл №10	ФКГГ	Гиперкальциемия, гиперкальциурия, тяжелая ХПН, фибрилляция желудочков, мочекаменная болезнь, саркоидоз, одновременный прием сердечных гликозидов; беременность, период лактации. С осторожностью ХПН легкой и средней степени тяжести, дегидратация, нарушение электролитного баланса (риск гиперкальциемии), заболевания сердца (риск аритмии), заболевания почек, "легочное" сердце, респираторный ацидоз, дыхательная недостаточность (риск токсических реакций вследствие окисления кальция хлорида).
	Калия и магния аспарагинат	Раствор для инъекций (ампулы) амп. 10мл № 5, табл. № 50, раствор для инфузий 250мл и 500мл	ГГ	Гиперчувствительность, острая и хроническая почечная недостаточность, гиперкалиемия, гипермагниемия, недостаточность коры надпочечников, AV блокада, нарушение обмена аминокислот, гемолиз, тяжелая миастения.Для таблеток (дополнительно): артериальная гипотезия. С осторожностью Беременность, период лактации.Для парентерального введения (дополнительно): кардиогенный шок (систолическое АД менее 90 мм рт.ст), гипофосфатемия, выраженная печеночная недостаточность, метаболический ацидоз, риск возникновения отеков, ХПН (в случае, если проведение регулярного контроля концентрации Mg2+ в сыворотке крови является невозможным - риск кумуляции).
	Пиридоксин+Тиамин+Цианокобаламин+(Лидокаин)	Амп. 2мл № 5, драже 0,1 № 60	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ИБС. Энцефалопатия Вернике, предклимактерический и климактерический период у женщин
	Менандиона натрия бисульфит	Раствор для инъекций 1%	ГГ	Гиперчувствительность, гиперкоагуляция, тромбоэмболия, гемолитическая болезнь новорожденных. С осторожностью Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, печеночная недостаточность, беременность.
	Пиридоксин	Раствор для инъекций	ГГ	Гиперчувствительность. С осторожностью Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, ИБС.
	Никотиновая кислота Тиамин	Ампулы 10мг/мл №5 или№10 Раствор для инъекций (ампулы) 50мг/мл 1 мл №10	ФК ГГ	Противопоказания:язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки (в стадии обострения); подагра; гиперурикемия; Гиперчувствительность. С осторожностью Энцефалопатия Вернике, предклимактерический и климактерический период у женщин
21.	Прочие средства			

	Алпростадил	Порошок для приготовления р-ра 20мкг № 10	ГГ	Гиперчувствительность, беременность, период лактации.У новорожденных: угнетение функции дыхания, респираторный дистресс-синдром, состояние спонтанного стойко открытого артериального протока. С осторожностью Острый и подострый инфаркт миокарда, перенесенный в течение последних 6 мес инфаркт миокарда, тяжелая или нестабильная форма стенокардии, декомпенсированная ХСН, артериальная гипотензия, сердечно-сосудистая недостаточность (особое внимание следует уделять контролю нагрузки объема раствора-носителя), отек легких, выраженные нарушения ритма сердца, бронхообструктивный синдром (тяжелой степени с признаками дыхательной недостаточности), инфильтративные изменения в легких, печеночная недостаточность (в т.ч. в анамнезе), повышенный риск возникновения кровотечения (язва желудка или 12-перстной кишки, тяжелое поражение сосудов головного мозга, пролиферативная ретинопатия со склонностью к кровотечениям, обширная травма и т.п.), гемодиализ, (лечение препаратом следует проводить в постдиализном периоде), сахарный диабет типа 1, особенно при обширных поражениях сосудов (у пожилых больных). Сопутствующая терапия сосудорасширяющими или антикоагулянтными ЛС. У новорожденных: брадипноэ, артериальная гипотензия, тахикардия или гипертермия.
	Бацитрацин+неомицин (банеоцин)	Порошок для наружного применения 10,0	ФК	Противопоказание: гиперчувствительность
	Гидроксиметилхиноксалидиоксид (диоксидин, диоксисепт)	Раствор ждля наружного применения, амп. 1% 10сл №10	ФК	Противопоказание: гиперчувствительность
	Вазелин	мазь	ГГ	Противопоказания: гиперчувствительность
	Водорода перекись	Раствор 3% и 20%	ГГ	Противопоказание: гиперчувствительность
	Антигриппин максимум	Капсулы № 20	ГГ	Гиперчувствительност, почечная и/или печеночная недостаточность, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы, детский возраст (до 1 года). С осторожностью Гипероксалатурия, почечная и печеночная недостаточность, гемохроматоз, талассемия, полицитемия, лейкемия, сидеробластная анемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, серповидно-клеточная анемия, прогрессирующие злокачественные заболевания, доброкачественные гипербилирубинемии (в т.ч. синдром Жильбера), вирусный гепатит, алкогольное поражение печени, алкоголизм, беременность, период лактации, пожилой возраст

	Парацетамол+хлорфенамин+аскорбиновая кислота	Порошок № 8	ГГ	Гиперчувствительност, почечная и/или печеночная недостаточность, закрытоугольная глаукома, гипертрофия предстательной железы, детский возраст (до 1 года). С осторожностьюГипероксалатурия, почечная и печеночная недостаточность, гемохроматоз, талассемия, полицитемия, лейкемия, сидеробластная анемия, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, серповидно-клеточная анемия, прогрессирующие злокачественные заболевания, доброкачественные гипербилирубинемии (в т.ч. синдром Жильбера), вирусный гепатит, алкогольное поражение печени, алкоголизм, беременность, период лактации, пожилой возраст
	Пентоксифиллин	Раствор для инъекций 2% (ампулы) 5 мл № 10,№ 5 таб.600мг № 20	ГГ	Гиперчувствительность к пентоксифиллину и др. производным ксантина; острый инфаркт миокарда; массивное кровотечение, геморрагический инсульт, обширное кровоизлияние в сетчатку глаза, беременность, период лактации, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не изучены).Для в/в введения (дополнительно) - аритмии, выраженный атеросклероз коронарных или мозговых артерий, неконтролируемая артериальная гипотензия. С осторожностью Артериальная гипотензия (риск выраженного снижения АД), ХСН, состояние после недавно перенесенных оперативных вмешательств, тяжелая печеночная недостаточность, тяжелая ХПН (КК менее 30 мл/мин).
	Этилметилгидроксипиридина сукцинат	Раствор для инъекций 5%(ампулы)5мл № 5 и 2мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность; острая печеночная и/или почечная недостаточность; беременность, лактация, детский возраст. С осторожностью Аллергические заболевания в анамнезе (для парентерального введения).
22. Средства, применяющиеся при отравлениях				
	Натрия тиосульфат	Раствор для инъекций 30% (ампулы) 10 мл № 10	ГГ	Гиперчувствительность.

y